

Previsión agrometeorológica para finales de julio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2020 Брой: 7/2020



A finales de julio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo cálido con temperaturas en torno y por encima de la norma. Durante la primera mitad del periodo, se pronostican nuevamente precipitaciones en el oeste y en algunas partes del centro de Bulgaria, lo que mejorará el contenido de humedad de las capas superiores del suelo. En el periodo pasado en estas regiones, se registraron lluvias agrícolamente significativas de entre 20 y 40 l/m², pero de carácter local. En la parte restante del país, la ausencia de precipitaciones ha provocado un creciente déficit hídrico del suelo.

Durante el periodo, tendrán lugar las fenofases de floración y llenado de grano en el girasol. En algunos híbridos más tempranos, sembrados dentro del plazo agrotécnico, se producirá la fase de maduración (estaciones agrometeorológicas de Sliven, Lyubimets). En el maíz, se observarán diferentes fases: en los

híbridos tardíos, estarán en curso el espigado y la floración; en los híbridos de media estación, se observarán el emparvado y el pardeamiento de los estigmas; y en los híbridos de maíz más tempranos en partes de la Llanura Danubiana (estación agrometeorológica de Pavlikeni) se observará la madurez lechosa. En la vid, se observará la fase de envero y ablandamiento de la baya.

Durante el periodo, las condiciones serán adecuadas para llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales relacionadas con la labranza del suelo en áreas liberadas de cultivos de cereales de invierno: cultivo de rastros, con el objetivo de interrumpir los capilares del suelo y preservar la humedad edáfica disponible, labranza previa a la siembra y arada, y tratamientos con herbicidas totales en caso de fuerte infestación de malezas en áreas después de la cosecha. En los huertos de manzanos y viñedos, continúa la pulverización con fungicidas para prevenir la infección y el desarrollo del oídio. Las actividades de protección de plantas deben llevarse a cabo a una temperatura del aire que no exceda los 25°C.

Fuente NIMH