

# Pronóstico agrometeorológico para agosto

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 09.08.2020 Брой: 8/2020



*El plazo agrotécnico para la siembra de la colza comienza en la tercera decena de agosto. En agosto, para las variedades tardías de frutales, no debe subestimarse la actividad nociva de la última generación de gusanos de la fruta. El tiempo relativamente seco durante la mayoría de los días del mes será un requisito previo para un aumento de las poblaciones de ácaros. En los viñedos es necesario monitorear la aparición y densidad de las orugas de la tercera generación de la polilla del racimo de la vid europea.*

En agosto, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas del mes.

A principios de agosto, el desarrollo de los cultivos de primavera tardíos en la mayor parte del país procederá bajo un déficit de humedad del suelo cada vez mayor. Se observarán excepciones en lugares del noroeste de Bulgaria y el campo de Sofía, donde las precipitaciones de julio superaron las normas mensuales (Novo Selo - 84 l/m<sup>2</sup>, Vratsa - 128 l/m<sup>2</sup>, Montana - 88 l/m<sup>2</sup>, Sofía - 111 l/m<sup>2</sup>, Kyustendil - 72 l/m<sup>2</sup>, Dragoman - 56 l/m<sup>2</sup>) y aumentaron el nivel de las reservas de humedad en la capa de suelo de 50 y 100 cm. En las regiones occidentales del país, las precipitaciones pronosticadas durante la segunda mitad de la primera decena de agosto proporcionarán humedad para la vegetación de los híbridos de maíz más tardíos y de los segundos cultivos.

En el este de Bulgaria y en las regiones del sur, no se esperan precipitaciones durante la primera decena de agosto y en algunos lugares la sequía cada vez más profunda pondrá en duda la cosecha de los cultivos de primavera cultivados en condiciones de secano. En algunas de estas regiones, como resultado de las escasas lluvias de julio - en algunos lugares por debajo de 2-3 l/m<sup>2</sup> (Ruse, Shabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardzhali), las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 y 100 cm están completamente agotadas (estación agrometeorológica de Sliven).

Para mediados de agosto, las altas temperaturas pronosticadas, con valores máximos de hasta 36-38°C, conducirán a un acortamiento de los períodos interfásicos en el desarrollo de los cultivos de campo tardíos. Valores de este orden, combinados con una baja humedad atmosférica, tendrán un impacto negativo en la floración y fertilización de los cultivos hortícolas de la producción de campo tardía.

Durante la primera decena de agosto, los híbridos de maíz más tempranos completarán su desarrollo, y los híbridos de maduración media-temprana entrarán en la etapa de madurez lechosa. En el girasol en la llanura del Danubio y en las regiones del sur, se observará la etapa de maduración. Al final de la segunda y principios de la tercera decena en las regiones de campo, el girasol estará predominantemente en madurez técnica. Durante la tercera decena, los híbridos de maíz de maduración media-tardía entrarán en la madurez cerosa. En el arroz, se observará la etapa de madurez lechosa, en la soja - la etapa de maduración, y en el algodón - el comienzo de la apertura de las cápsulas.

Se pronostica para la segunda mitad de la tercera decena la probabilidad de precipitaciones, mejora de la condición físico-hídrica del suelo en las capas superiores y de las condiciones para llevar a cabo la labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a la siembra con colza de invierno. El plazo agrotécnico para la siembra de la colza comienza en la tercera decena de agosto.

En agosto, para las variedades tardías de frutales, no debe subestimarse la actividad nociva de la última generación de gusanos de la fruta. El tiempo relativamente seco durante la mayoría de los días del mes será un requisito previo para un aumento de las poblaciones de ácaros. En los viñedos es necesario monitorear la aparición y densidad de las orugas de la tercera generación de la polilla del racimo de la vid europea. Las pulverizaciones de protección de plantas deben realizarse durante las horas más frescas del día con productos que tengan un intervalo pre-cosecha apropiado, acorde con el período de maduración de los cultivos.

*Fuente: NIMH*