

A principios de septiembre existen condiciones adecuadas para la cosecha de los cultivos de siembra primaveral y para la recolección de la cosecha de frutas y hortalizas.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020*



A finales de agosto, las condiciones agrometeorológicas se caracterizaron por temperaturas superiores a lo normal y falta de precipitaciones, lo que tuvo un impacto negativo en las etapas finales de desarrollo de los cultivos de primavera tardíos y dificultó la ejecución adecuada de la labranza previa a la siembra.

Durante el período siguiente, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas cercanas a las normas climáticas. Al comienzo del período, se pronostican precipitaciones económicamente

significativas en algunos lugares del noreste de Bulgaria. Durante el período, el girasol estará predominantemente en la etapa de madurez técnica. En los híbridos de maíz tardío, ocurrirán las etapas de madurez lechosa y cerosa. Está en curso el período óptimo para la siembra de áreas de colza de invierno. En muchas regiones, la sequía del suelo impedirá las actividades agrotécnicas y la siembra de colza de invierno. Esto requerirá siembras más tardías, pudiendo extenderse el período de siembra posible hasta finales de mes. En los huertos de manzanos, se monitorea la actividad dañina de la segunda generación de carpocapsa y, si es necesario, se realizan tratamientos contra la plaga. Se lleva a cabo la desinfección de semillas de trigo y cebada destinadas a la siembra de otoño contra enfermedades transmitidas por semillas (carbón común, carbón volador, mancha foliar por septoria y enfermedades por fusarium).

Las condiciones serán adecuadas para la cosecha de cultivos de primavera que hayan alcanzado la madurez técnica, para llevar a cabo actividades de protección vegetal en cultivos perennes y para la cosecha de frutas y hortalizas.

Fuente: NIMH