

Pronóstico agrometeorológico para septiembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 *Брой:* 9/2020



También en septiembre, las condiciones agrometeorológicas en el oeste de Bulgaria diferirán significativamente de las de las regiones orientales del país.

En el este de Bulgaria estarán determinadas por temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones inferiores a lo normal. En muchos lugares de las regiones orientales, como resultado de la prolongada sequía estival, los cultivos de primavera completaron su vegetación prematuramente. En estas zonas, la cosecha de girasol y de los híbridos de maíz más tempranos comenzó antes de las fechas habituales, con rendimientos muy por debajo del promedio del país.

En septiembre, en la mayor parte de las regiones occidentales, las etapas finales de desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos tendrán lugar bajo temperaturas superiores a lo normal, con precipitaciones cercanas a las normas climáticas y con buenas reservas de humedad del suelo a finales del verano en las capas de 50 y 100 cm (más del 70% de la capacidad de campo – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – como resultado de las precipitaciones superiores a lo normal en agosto (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofía – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Durante la primera decena de septiembre, se pronostican nuevamente precipitaciones de significación agronómica para la mitad occidental del país. Tendrán un efecto beneficioso sobre los segundos cultivos y los híbridos de maíz tardíos, que se encontrarán en la etapa de madurez lechosa. Durante esta decena, en las áreas de campo los híbridos medio-tardíos entrarán en la etapa de madurez cerosa. Para mediados de mes, parte de los híbridos tardíos completarán su desarrollo. Durante la segunda decena, el arroz estará en las etapas de madurez cerosa y madurez completa. Durante la tercera decena, la etapa de maduración ocurrirá en el algodón, el maní, las variedades de frutales de otoño y las variedades de uva más tardías. Para el mes, los valores mínimos de temperatura pronosticados están por encima de los umbrales críticos para los cultivos hortícolas, lo cual es un requisito previo para obtener producción hortícola adicional del cultivo de campo tardío.

En la mayoría de los días de la segunda y tercera decena, se espera un tiempo relativamente seco y las condiciones serán adecuadas para despejar las áreas de cultivos de primavera.

También en septiembre, en gran parte de las regiones orientales, la falta de humedad en las capas superiores del suelo dificultará la realización de calidad del arado profundo y la labranza previa a la siembra de las áreas designadas para la siembra de colza oleaginosa de invierno y cultivos de cereales de invierno. El marco de tiempo óptimo para la siembra de colza oleaginosa es hasta el final de la segunda decena del mes. En la tercera decena, comienzan en los campos a mayor altitud las fechas agrotécnicas de siembra para la cebada y el trigo.

Fuente: NIMH