

Octubre nos espera con un otoño cálido y seco

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



A principios del otoño, tras la prolongada sequía, las condiciones agrometeorológicas experimentaron un cambio positivo. Las precipitaciones, en muchas partes del país superiores a 20–30 l/m² (Vratsa, Knezha, Oryahovo, Sofía, Dragoman, Kyustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlak, Kardzhali, Elhovo, Razgrad, Burgas), aumentaron el contenido de humedad en las capas superiores del suelo, lo cual es de gran importancia para la correcta implementación de la labranza estacional. Existen excepciones en partes de la Llanura Tracia y en las regiones orientales, donde las lluvias de finales de septiembre no tuvieron significación económica.

En octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas y precipitaciones por debajo de la norma mensual.

Durante la primera decena, no se pronostican precipitaciones significativas y en la mayoría de las zonas de campo las condiciones permitirán realizar la labranza previa a la siembra y la siembra de cultivos de otoño. Este año la sequía ha dificultado la siembra de la colza de invierno y una gran parte de las superficies planificadas se sembrarán en octubre – después de los plazos agrotécnicos. Aumenta la probabilidad de que los cultivos sembrados más tarde no puedan formar una roseta (7–8 hojas) para el final de su vegetación otoñal, una fase en la que la colza inverna con éxito.

Octubre es el período óptimo para la siembra de cultivos cerealistas de invierno. En la primera quincena del mes es el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, en la segunda quincena – para el sur de Bulgaria, y en la tercera decena – para las zonas a lo largo de la costa del Mar Negro.

Durante la primera decena, las temperaturas estacionalmente altas previstas, con valores máximos de hasta 25–30°C, acelerarán la maduración de las variedades tardías de uva para vino y proporcionarán condiciones para obtener producción adicional de cultivos hortícolas de la producción tardía de campo.

Tras el tiempo inusualmente cálido de la segunda quincena de octubre, se espera una normalización gradual de las condiciones térmicas. Las precipitaciones previstas durante la segunda y la primera mitad de la tercera decena serán de gran importancia para el curso normal de las fases iniciales de vegetación de los cultivos de otoño sembrados. A finales de octubre, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán en el trigo las siguientes fases: emergencia, tercera hoja y comienzo del ahijamiento en los cultivos más tempranos sembrados, sembrados a principios de octubre.

Las temperaturas superiores a lo normal previstas durante el mes crearán condiciones para un aumento de la población de ciertas plagas – el topillo común. En octubre, se deben monitorear los cultivos de otoño y, cuando la población de topillos supere el umbral económico de daño (2 colonias activas por decárea), es necesario el control con rodenticidas autorizados (gránulos de Phostoxin) – cebos venenosos que se colocan en las entradas de las colonias.

En la mayoría de los días del mes, las condiciones serán adecuadas para la cosecha de la fruta. En los huertos de manzanos y perales afectados por la sarna, para reducir el inóculo es aconsejable, al inicio de la caída de la hoja, después de la recolección de la fruta, realizar un tratamiento con una solución de urea al 5%.

Para las especies de fruta de hueso, después de la caída masiva de las hojas, se recomienda la pulverización con una mezcla de Burdeos al 2% contra los agentes causantes de la cribado, la podredumbre parda temprana, el enrollamiento de la hoja del melocotonero, etc.