

Verifique los cultivos regularmente en busca de topillo común durante octubre y noviembre.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



En octubre y noviembre, los cultivos de otoño deben ser inspeccionados y, cuando la densidad de población de la plaga topillo común supera el umbral de daño económico (2 colonias activas por decárea), son necesarias medidas de control.

Topillo común (*Microtus arvalis*) – está extendido por todo el país. Causa daños en cultivos de cereales, alfalfa, colza, huertos, etc. Vive en colonias en largas galerías con un número variable de aberturas en la superficie del suelo. Las colonias habitables se identifican por los montículos de tierra esparcidos, la abertura bien formada y las hojas verdes insertadas en ella. En inviernos cálidos y secos, la capacidad reproductiva del topillo es muy alta. Se reproduce durante todo el año, y la descendencia de una sola pareja puede alcanzar

hasta 2400 individuos. Se alimenta de las partes verdes de la planta. Se observan daños desde la emergencia del cultivo hasta la cosecha. En casos de infestación grave, el cultivo se vuelve ralo. Después de la cosecha, se recomienda una labranza profunda para destruir las colonias y eliminar cualquier vegetación de malezas que pueda emerger y que sirva de alimento para el topillo. Durante las inspecciones de campo, se determina la densidad de población del topillo, y cuando hay 2 colonias activas por decárea, se colocan cebos envenenados en las aberturas (las habitables) y se pisotean para proteger a las aves y a la fauna beneficiosa. El tratamiento se realiza con rodenticidas autorizados para este fin (gránulos de Phostoxin) – cebos envenenados que se colocan en las entradas de las colonias.