

Mejora de las condiciones para la realización de actividades agrotécnicas estacionales a mediados de octubre

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



A mediados de octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas cercanas a la norma para la segunda decena de octubre. Las precipitaciones significativas del período pasado superaron los 40-50 l/m² en muchas partes del país (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Pleven - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), lo que condujo a una mejora brusca de las reservas de humedad del suelo en los horizontes superiores y de las condiciones para las etapas iniciales de vegetación de los cultivos de otoño sembrados. Al inicio del período, se esperan más precipitaciones y un aumento de las reservas de

humedad del suelo en la capa de 50 cm. En muchos lugares del oeste y centro de Bulgaria alcanzarán niveles de hasta y por encima del 75% de la capacidad de campo. También se espera un cambio positivo en los niveles de humedad del suelo en las regiones nororientales del país, que fueron las más afectadas por la sequía prolongada.

A mediados del período, se pronostica un descenso sustancial de las temperaturas, y en los campos de cuenca – valores mínimos críticos para los cultivos hortícolas sensibles a las heladas. El desarrollo de los cultivos de otoño sembrados al final de la segunda y comienzos de la tercera decena procederá bajo condiciones térmicas por debajo de lo normal. En el trigo y la cebada sembrados durante la primera decena de octubre, predominará la etapa de emergencia. En los cultivos de cereales de invierno sembrados antes, a finales de septiembre y principios de octubre, se observará la formación de hojas (1–2 hojas).

Se espera una mejora en las condiciones para llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales, la más importante de las cuales es la siembra de trigo, al final del período. La próxima semana de siete días coincide con el plazo agrotécnico para la siembra de cultivos de cereales de invierno en el sur de Bulgaria.

Durante la tercera decena de octubre, en los cultivos de trigo sembrados antes, se debe monitorear la densidad de población de ciertas plagas: topillo común, escarabajo de la hoja del trigo, moscas de los cereales, etc., que causan graves daños a los cultivos de cereales de invierno en las etapas iniciales de su vegetación.

Fuente: NIMH