

'Precipitaciones y condiciones adecuadas para plantar árboles frutales en noviembre'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



Tras la prolongada sequía, las precipitaciones superiores a lo normal de octubre, que en algunos lugares del norte de Bulgaria superaron los 70-80 l/m² (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), provocaron un aumento significativo de las reservas de humedad en las capas superiores del suelo y una mejora de las condiciones para el progreso de las fases iniciales de la vegetación de los cultivos de otoño sembrados. A finales de octubre, en las estaciones agrometeorológicas de Silistra, Knezha, Sofía, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik y Plovdiv, en la capa de 50 cm para los cultivos de cereales de invierno, los niveles alcanzaron hasta y por encima del 75-80% de la capacidad de campo.

En noviembre, las precipitaciones previstas, en torno y por encima de la norma mensual, aumentarán las reservas de humedad otoñales en la capa de suelo de 50 y 100 cm.

Durante la primera quincena de noviembre, el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno y de la colza de invierno proseguirá a un ritmo moderado, con temperaturas cercanas a las normas climáticas. Durante este período, en el trigo, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán diferentes fases: emergencia, tercera hoja y ahijamiento en los cultivos sembrados temprano, a finales de septiembre y principios de octubre.

Se prevé un enfriamiento y un cambio sustancial en las condiciones agrometeorológicas hacia el final de la segunda decena. En los campos más altos, donde no se descartan precipitaciones en forma de nieve, se observará un cese de los procesos vegetativos en los cultivos de otoño.

Durante la tercera decena de noviembre, el desarrollo de los cultivos en la mayoría de las regiones de campo proseguirá a un ritmo más lento, con temperaturas cercanas al mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno. Se crearán condiciones para procesos vegetativos más activos en el trigo, la cebada y la colza de invierno en las regiones meridionales y sudorientales del país. A finales de noviembre, predominarán los cultivos de trigo y cebada en fase de tercera hoja.

Este año, la sequía impidió la siembra oportuna de la colza de invierno. Por esta razón, a finales de noviembre solo una parte de los cultivos, principalmente los sembrados a principios del otoño, mostrará el inicio de la fase de formación de roseta (5-6 hojas).

En noviembre, las temperaturas mínimas previstas, de hasta -7°C , están por encima de los niveles críticos para los cultivos de otoño que se encuentran en una etapa inicial de su desarrollo.

Se producirán condiciones más adecuadas para la plantación de árboles frutales durante la primera mitad del mes.

Fuente: NIMH