

Pronóstico agrometeorológico para finales de noviembre y principios de diciembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



A finales de noviembre, el país amaneció bajo un manto de nieve. Anoche cayó la primera nevada de la temporada en el oeste de Bulgaria. Las temperaturas bajaron de cero, por lo que las precipitaciones en Sofía, Razgrad, Pernik y Kyustendil se convirtieron en nieve. Se espera que el manto de nieve alcance hasta 5 cm, excepto en la Llanura Danubiana, donde su espesor será de entre 10 y 15, y en algunos lugares de hasta 20 cm.

A finales de noviembre y principios de diciembre, las condiciones agrometeorológicas serán cada vez más dinámicas. Al inicio del periodo estarán determinadas por un tiempo suave para la temporada, con temperaturas

medias diarias en la mayoría de las zonas de campo alrededor y por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno y la colza de invierno.

Durante este periodo, se pronostica un descenso significativo de las temperaturas y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. El enfriamiento esperado conducirá a una desaceleración, y en los campos más altos y el Pre-Báltico, donde se pronostican precipitaciones, incluida nieve, a un cese de los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño. Se producirán excepciones en algunos lugares de las regiones del sureste y a lo largo de la costa del Mar Negro, donde se observará una vegetación débilmente expresada de los cultivos de cereales de invierno.

A principios de diciembre, en los cultivos de trigo sembrados dentro del periodo agrotécnico, en octubre, se observará la etapa de ahijamiento, en la que los cultivos de cereales de invierno invernán con éxito. La etapa de la tercera hoja prevalecerá en los cultivos sembrados a principios de noviembre. Los cultivos sembrados tardíamente, a mediados de noviembre, no están bien establecidos y se encuentran en las etapas de emergencia y formación inicial de hojas. En la colza, se observará la etapa de roseta, la etapa adecuada para la invernada, en los cultivos sembrados a principios de otoño.

Durante el próximo periodo, se esperan precipitaciones y una mejora de las reservas de humedad del suelo en las capas superiores del suelo. Como resultado de las precipitaciones de noviembre por debajo de lo normal, las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y 100 cm en los campos de trigo en la mayor parte del país son inusualmente bajas para la temporada – en algunos lugares de las regiones orientales y del extremo sur por debajo del 60% de la capacidad de campo (estaciones agrometeorológicas de Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

Al inicio del próximo periodo, las condiciones serán adecuadas para plantar árboles frutales y para llevar a cabo pulverizaciones de protección fitosanitaria de otoño en cultivos frutales.

Para proteger los cultivos frutales del frío invernal, para destruir líquenes y musgos, y para repeler la chinche apestosa marmorada marrón y la polilla leopardo, es necesario tratar los troncos y las ramas gruesas de los árboles con una lechada de cal al 20% a la que se añade una pequeña cantidad de arcilla.