

Pronóstico agrometeorológico para diciembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.12.2020 Брой: 12/2020



A principios de diciembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas inferiores a lo normal. La ola de frío prevista provocará una desaceleración y, en el norte de Bulgaria y en los campos altos, un cese de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno y la colza.

Durante la primera decena, las condiciones permitirán la realización de labores estacionales del suelo (arado profundo de las áreas destinadas a la siembra de primavera) y actividades fitosanitarias en los cultivos permanentes. A mediados del periodo, se pronostican precipitaciones generalizadas y una mejora de la humedad del suelo.

Durante la segunda mitad de la primera decena, se pronostica un aumento significativo de las temperaturas, pero sus valores medios diarios, con excepción de algunos lugares de las regiones sureste y a lo largo de la costa del Mar Negro, no alcanzarán el mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos sembrados en otoño.

Durante la mayoría de los días de la segunda y tercera decena, las temperaturas previstas, en torno y por encima de las normas climáticas, mantendrán los cultivos de cereales de invierno en estado de latencia en la mayor parte del país. Son posibles excepciones para el trigo y la cebada en las regiones extremas del sur y sureste. En estas regiones, durante los periodos relativamente más cálidos, se observará una reanudación a corto plazo de los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño, pero no se espera un cambio en las fases fenológicas de los cultivos.

Al comienzo del invierno, en el trigo, como resultado de la siembra tardía de otoño y el déficit hídrico del suelo que se profundizó en noviembre, se observarán diferentes fases. En los cereales de invierno sembrados en octubre dentro del plazo agrotécnico, prevalecerá la fase de ahijamiento. Los cultivos sembrados a principios de noviembre invernarán en la fase de tercera hoja, mientras que los sembrados tarde, en la segunda quincena de noviembre, estarán en la fase de emergencia y formación inicial de hojas. En la colza, solo una parte de los cultivos logró, durante su vegetación otoñal, formar una roseta, la fase en la que las plantas invernan con éxito.

En diciembre, los valores pronosticados de las temperaturas mínimas, de hasta -11°C, en condiciones sin cobertura de nieve y con una persistencia más prolongada, serán críticos para los cereales de invierno que se encuentren en la fase de emergencia.

Las precipitaciones previstas en diciembre, en torno a la norma mensual, aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 y 100 cm. Como resultado de las precipitaciones de noviembre inferiores a lo normal, en muchas partes del país del orden de 6–7 l/m², el nivel de reservas de humedad del suelo en los cereales de invierno es inusualmente bajo para la segunda mitad del otoño. En algunos lugares del sur de Bulgaria y en parte de las regiones orientales, están por debajo del 60% de la capacidad de campo (estaciones agrometeorológicas Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

