

Pronóstico agrometeorológico para febrero

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 Брой: 2/2021



Durante la primera decena de febrero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a lo normal y en muchos lugares de las zonas de llanura sus valores medios diarios alcanzarán el mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno.

A finales de la primera y principios de la segunda decena, se espera un descenso de las temperaturas, que impedirá una vegetación prematura en los cultivos sembrados en otoño y en algunas especies frutales de hueso de floración temprana en las regiones de llanura del país. Durante la segunda decena, las temperaturas medias diarias previstas estarán cerca de las normas climáticas y mantendrán los cultivos agrícolas invernantes en estado de latencia.

Durante la tercera decena, las condiciones agrometeorológicas volverán a estar determinadas por temperaturas superiores a lo normal, lo que perturbará la latencia relativa de los cultivos sembrados en otoño y la latencia forzada de algunos cultivos frutales de floración temprana. A finales de febrero, en los cultivos de cereales de invierno en lugares del sur de Bulgaria y a lo largo de la costa del Mar Negro, se crearán condiciones para una vegetación retrasada, pero no se espera un cambio significativo en el estado fenológico de los cultivos. En el trigo, se observarán las etapas de crecimiento de la tercera hoja y el ahijamiento. En las regiones extremas del sur y sureste, en algunas especies frutales de hueso de floración temprana (almendro, melocotonero, cerezo), se producirá la hinchazón de las yemas y en algunos lugares el inicio de su apertura.

En febrero, los valores previstos de las temperaturas mínimas, de hasta menos 12-13°C, en condiciones sin cubierta de nieve y con una duración más prolongada, supondrán un riesgo para los cultivos de cereales de invierno sembrados tardíamente que detuvieron su vegetación en la etapa de 2-3 hojas, y para los cultivos de colza que no lograron formar una roseta durante su vegetación otoñal.

Las precipitaciones esperadas durante el mes, alrededor y por encima de la norma, aumentarán las reservas de humedad en la capa de suelo de dos metros. Como resultado de las precipitaciones superiores a lo normal de enero, que en muchos lugares del país superaron los 140-150 l/m² (Vratsa -146 l/m², Shumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardzhali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro en los cultivos de cereales de invierno alcanzaron niveles cercanos a la capacidad de campo (CC).

Durante la primera y segunda decena de febrero, el alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo limitará las posibilidades de realizar algunas actividades agrotécnicas – la fertilización de cobertera de los cultivos sembrados en otoño con fertilizantes minerales nitrogenados, la labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a cultivos de primavera temprana (guisante, veza, avena, cebada de primavera). Condiciones más adecuadas para la poda en viñedos y huertos, y para los tratamientos fitosanitarios de invierno en huertos, estarán disponibles la mayoría de los días de la primera y tercera decena de febrero.

Fuente: NIMH