

Períodos críticos para enfermedades y plagas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Girasol

Emergencia – 4^a–5^a hoja – gorgojos (gorgojo gris del maíz *Tanymecus dilaticolis*, gorgojo negro de la remolacha *Psallidium maxilosum*)

Emergencia – formación del capítulo – mildiu *Plasmopara halstedii*

Germinación – emergencia – floración – podredumbre gris *Botritis cinerea*

Cotiledones – inicio de la floración – roya *Puccinia helianthi*

5^a–6^a hoja – formación del capítulo – manchas foliares grises *Diaporthe helianthi*, manchas foliares marrones *Alternaria sp.*, podredumbre carbonosa *Macrophomina phaseolina*, verticilosis *Verticilium sp.*

Floración – madurez amarilla – esclerotinia *Sclerotinia sclerociorum*

Floración – llenado de la semilla – podredumbre seca del capítulo *Rizopus sp.*

Maíz

Antes de la siembra – durante la siembra – 6^a–7^a hoja – gusanos de alambre de la familia *Elateridae*

Germinación – podredumbre de la semilla y la plántula *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oriza*

Emergencia – 5^a–7^a hoja – gorgojos (gorgojo gris del maíz *Tanymecus dilaticolis* y gorgojo gris de la remolacha *Tanymecus palidus*), rosquillas de la familia *Noctuidae*

Desde el inicio de la vegetación – pulgones *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1^a–9^a hoja – *enfermedades virales* (mosaico enanizante del maíz *Maize dwarf mosaic virus* y mosaico de la raya del trigo *Wheat streak mosaic virus*)

5^a–6^a hoja – floración – carbón común *Ustilago zeae*

6^a–8^a hoja – espigado – taladro del maíz *Ostinia nubilalis*, gusano del capítulo *Helicoverpa armigera*

Floración – madurez lechosa – podredumbre del tallo *Fusarium sp.*, tizón foliar *Helminthosporium turcicum*

Madurez lechosa – madurez completa – *fusariosis de la mazorca*

Colza

Cotiledones – formación de la roseta – pulguillas de las crucíferas del género *Phyllotreta*: pulguilla negra de la col (*Phyllotreta atra* L.), pulguilla ondulada (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) y otras, pulguilla del tallo de la colza (*Psylliodes chrysocephala* L., mosca de sierra de la colza (*Atalia rosae* Christ.), escarabajo de la colza (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Alargamiento del tallo – formación de los escapos florales - chinche de la col (*Eurydema ornata* L.), chinche de la colza (*Eurydema oleraceum* L.), mariposa de la col (*Pieris brassicae* L.), mariposa de la naba (*Pieris rapae*

L.), polilla de la col (*Mamestra brassicae* L.), gorgojos de las semillas del género *Ceutorhynchus*.

Formación del botón floral – floración_- escarabajo de las flores de la colza (*Meligethes aeneus* F.), escarabajo velludo (*Tropinota hirta* Poda.), gorgojos de las semillas del género *Ceutorhynchus*: gorgojo del tallo de la colza (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), gorgojo del tallo de la col (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (sinónimo *Ceutorhynchus quadridens*).

Formación de la vaina – gorgojo de las vainas (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), pulgón de la col (*Brevicoryne brassicae* L.), mosquita de las vainas (*Dasyneura brassicae* Winn.).

¡Monitoree los cultivos y tome medidas a tiempo!