

Pronóstico agrometeorológico para marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



Tras el breve período frío a principios de marzo, durante la mayoría de los días de la primera quincena del mes, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas cercanas a las normas climáticas y al mínimo biológico requerido para el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno. Durante este período, se crearán condiciones para el inicio de la vegetación en los cultivos sembrados en otoño en las regiones meridionales del país.

Se pronostica un aumento sustancial de las temperaturas y una activación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno y las plantaciones perennes para la segunda mitad de la segunda decena del mes.

Durante la tercera decena, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo acelerado, bajo condiciones térmicas por encima de lo normal. A finales de mes, el trigo y la cebada estarán predominantemente en la etapa de ahijamiento, con una transición al alargamiento del tallo en los cultivos de algunas de las regiones meridionales y sudorientales del país. En la colza de invierno, que ha pasado el invierno en la etapa de roseta, se producirá la ramificación a gran escala.

En marzo, se observarán diversas etapas fenológicas en los cultivos frutales: desde la hinchazón de yemas y el brote hasta las etapas de racimo verde y floración en las especies de frutas de hueso de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero) en las regiones meridionales y en algunos lugares de la Llanura Danubiana, donde las temperaturas por encima de lo normal en febrero provocaron un desarrollo prematuro en los huertos.

En marzo, las temperaturas mínimas pronosticadas, de hasta -7°C, supondrán un riesgo para los cultivos frutales más avanzados en las etapas de formación de yemas y floración.

Las precipitaciones previstas en marzo, cercanas a la norma mensual, aumentarán las reservas de humedad del suelo incluso en la capa de dos metros. A finales de febrero, en la mayoría de las regiones cultivables, las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro bajo los cultivos de cereales de invierno estaban en niveles cercanos a la capacidad de campo. Se observaron excepciones en algunos lugares de la Llanura Danubiana (estaciones agrometeorológicas: Bazovets, Novachene, Pavlikeni) y en las regiones sudorientales (estaciones agrometeorológicas: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik), donde las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro bajo el trigo estaban por debajo del 90% de la capacidad de campo.

En marzo, habrá condiciones adecuadas para llevar a cabo actividades agrotécnicas estacionales (labranza previa a la siembra y siembra de cultivos de primavera tempranos y medio-tempranos: veza, avena, cebada de primavera, guisantes); tratamientos preventivos prefloración en huertos contra una serie de enfermedades (tizón de la flor o podredumbre parda temprana, cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero, sarna, etc.) durante la mayoría de los días de la primera y durante la segunda mitad de la tercera decena del mes.

Las frecuentes precipitaciones pronosticadas durante la segunda y la primera mitad de la tercera decena de marzo mantendrán un alto contenido de humedad en las capas superficiales del suelo y, por esta razón, en algunos lugares de las regiones meridionales se perderán los plazos agrotécnicos para la siembra de girasol. El período óptimo para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria ocurre entre el 15 y el 20 de marzo, y en la Llanura Danubiana comienza a mediados de la tercera decena del mes (25.03–5.04).

Fuente: NIMH