

'Temperaturas críticas para especies de frutas de hueso de floración temprana'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 *Брой:* 3/2021



Los eventos meteorológicos de finales del invierno, al término de la primera y al inicio de la segunda decena de marzo, interrumpieron los procesos vegetativos de los cultivos de otoño en gran parte de las regiones de campo del país y pusieron a prueba severamente a los frutales más avanzados en su desarrollo. En algunos lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones del sur (Plovdiv, Stara Zagora, Chirpan) se registraron temperaturas mínimas de hasta -6 a -7°C, críticas para algunos de los árboles frutales que han entrado en las fases de brotación y floración – almendro, albaricoquero y melocotonero.

Para la segunda quincena de marzo se pronostican temperaturas mínimas negativas y un mayor riesgo de daño para las especies de fruta de hueso de floración temprana.

Hasta el final de la segunda decena, las condiciones agrometeorológicas serán muy dinámicas. Tras el breve calentamiento y deshielo de mediados de marzo, se pronostican para la segunda mitad del periodo temperaturas por debajo de lo normal, lo que frenará el desarrollo de los cultivos agrícolas. Se esperan excepciones en las regiones más meridionales, donde las temperaturas medias diarias alcanzarán y superarán el mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos cerealistas de invierno. Al final del invierno, las parcelas de trigo se encontrarán predominantemente en la fase de ahijamiento.

Durante el próximo periodo se esperan precipitaciones significativas y un aumento de las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm. En la mayoría de las regiones de campo, para los cultivos cerealistas de invierno, alcanzarán niveles superiores al 90% de la capacidad de campo (CC).

Durante el periodo, las condiciones serán desfavorables para llevar a cabo las labores estacionales de labranza y para la siembra de los cultivos de primavera tempranos y de media estación. Es alta la probabilidad de que se pierdan los plazos agrotécnicos para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, que comienzan a mediados de marzo.

Fuente: NIMH