

A principios de abril, se observa una progresión activa de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



A pesar de la nevada esperada en las montañas y el enfriamiento pronosticado para principios de abril, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por valores de temperatura media diaria que permitirán el curso activo de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas. Para principios de abril, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para las especies frutales que se encuentran avanzadas en su desarrollo fenológico.

Durante el período, el trigo y la cebada en el sur de Bulgaria se encontrarán en la fase de alargamiento del tallo. En los cultivos de la llanura del Danubio, ocurrirán las fases de ahijamiento, transición al alargamiento del tallo e inicio del alargamiento del tallo. Para las especies frutales, las fases fenológicas observadas serán la brotación de yemas, el estado de yema y la floración. En la vid, tendrán lugar el flujo de savia y la hinchazón de yemas.

Durante el período, se crearán condiciones para llevar a cabo las operaciones agrotécnicas estacionales: siembra de girasol y preparaciones previas del suelo para los cultivos de primavera. En los cultivos permanentes, continuarán los tratamientos contra la sarna en las especies de fruta de pepita, contra la podredumbre parda temprana (tizón de la flor) y la criba en las especies de fruta de hueso, y contra el enrollamiento de la hoja en el melocotonero. Para lograr el máximo efecto de la pulverización, las actividades de protección vegetal deben realizarse con tiempo tranquilo y una velocidad de viento admisible de hasta 2-3 m/s.

Las precipitaciones pronosticadas durante los primeros días del período limitarán temporalmente las posibilidades de realizar actividades agrotécnicas.

Fuente: NIMH