

Pronóstico agrometeorológico para el mes de abril

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Durante la primera decena de abril, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas. Las condiciones térmicas previstas por encima de lo normal acelerarán los procesos vegetativos de los cultivos de cereales de invierno, y una gran parte de las parcelas en las zonas de campo entrarán masivamente en la fase de alargamiento del tallo. En la colza, se observará el ramificado y el comienzo de la fase de formación de yemas.

Durante la mayoría de los días de la decena, no se esperan precipitaciones significativas y las condiciones en muchas partes del país permitirán realizar la labranza previa a la siembra y la siembra de girasol. La primera decena de abril es el plazo agrotécnico para la siembra de girasol en el norte de Bulgaria.

A finales de la primera y principios de la segunda decena, se pronostica un descenso de las temperaturas, una estabilización del tiempo y un cambio sustancial en las condiciones agrometeorológicas. Durante este período, se esperan precipitaciones significativas y un aumento de las reservas de humedad del suelo, incluso en la capa de dos metros. A principios de la primavera, en la mayoría de las zonas de campo, las reservas de humedad del suelo para el trigo en la capa de un metro alcanzaron niveles superiores al 90% de la capacidad de campo. Se producen excepciones en algunas regiones orientales – estaciones agro-meteorológicas de Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven – donde el nivel de reservas de humedad es inferior, por debajo del 80% de la capacidad de campo.

A finales de la primera y principios de la segunda decena de abril, se pronostica una estabilización a corto plazo del tiempo y condiciones adecuadas para realizar ciertos tratamientos fitosanitarios urgentes en frutales: en la fase de yema floral en frutales de pepita (manzano, peral) contra la sarna; tratamientos post-floración en algunas especies de frutales de hueso de floración temprana contra el tizón de la flor (podredumbre parda temprana) y la criba; en cerezo y guindo contra la enfermedad fúngica más peligrosa – la cilindrosporiasis (llamada roya blanca), y otras.

Durante la segunda decena de abril, el desarrollo de los cultivos agrícolas proseguirá a un ritmo más lento, bajo condiciones térmicas inferiores a lo normal. A finales de la decena, se pronostica una mayor probabilidad de formación de heladas, lo que debe tenerse en cuenta al endurecer las plántulas de hortalizas y tabaco. Las temperaturas mínimas previstas, en algunos lugares de hasta -2 a -3°C, serán críticas para las flores y los frutos jóvenes de los árboles frutales si persisten durante más tiempo.

A principios de la tercera decena, se espera un calentamiento y en las zonas de campo las temperaturas del suelo en la capa de diez centímetros

alcanzarán valores adecuados para la siembra de maíz grano.

Durante la tercera decena, la vegetación de los cultivos agrícolas proseguirá a un ritmo moderado con temperaturas cercanas a las normas climáticas.

Durante este período, en los cereales de invierno se producirá la transición del alargamiento del tallo al espigado y la fase de espigado. En la colza, predominará la fase de floración.

En abril, las precipitaciones frecuentes crearán condiciones para un aumento del fondo infeccioso de una serie de enfermedades fúngicas en frutales – tizón de la flor (podredumbre parda temprana), sarna, criba, enrollamiento de la hoja del melocotonero, y otras. Las condiciones más adecuadas para realizar tratamientos fitosanitarios en frutales se darán durante la mayoría de los días de la primera y durante la primera mitad de la tercera decena.

Fuente: NIMH