

Pronóstico agrometeorológico para el mes de mayo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 Брой: 5/2021



Este año, el clima fresco durante la primera mitad de la primavera retrasó el desarrollo de los cultivos agrícolas. Durante la mayor parte de los días de mayo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable.

El pronóstico de temperaturas superiores a lo normal a principios de mayo acelerará los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño y en los cultivos de primavera ya sembrados. Durante la primera decena, se producirán varias etapas en el trigo: encañado, transición al espigado y espigado. En la cebada de las regiones del sur (Estación Agrometeorológica de Sandanski), se observará la etapa de floración. En la colza, tendrán lugar la floración, la fertilización y la formación de vainas.

Después del tiempo cálido al comienzo del mes, se pronostica una normalización de las condiciones térmicas para la segunda mitad de la primera decena. Las precipitaciones previstas durante este período retrasarán la implementación de algunas actividades agrotécnicas estacionales: finalización de la siembra de maíz grano, labranza previa a la siembra y siembra de cultivos termófilos tardíos de primavera (judías, algodón, cacahuets, etc.).

Durante la segunda y tercera decena, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo moderado, con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas. *Las precipitaciones previstas en la segunda quincena de mayo mantendrán un nivel muy bueno de reservas de humedad en las capas de suelo de 50 cm y 100 cm, por encima del 85% de la capacidad de campo (CC). Tendrá un efecto beneficioso sobre los cultivos cerealeros de invierno, en los que tendrá lugar la formación y el llenado del grano. A finales de mayo, en parte de los cultivos de trigo y cebada de las regiones del sur, se observará el inicio de la etapa de madurez lechosa.*

Durante el mes, se producirá la formación de hojas en el maíz y el girasol. A finales de mayo, en el girasol sembrado dentro del marco agrotécnico, se observará la formación de la inflorescencia.

En los cultivos frutales, se producirá la formación y el agrandamiento del cuajado. En la vid, se observará la emergencia de la inflorescencia, y a finales del mes, el inicio de la floración; estas etapas son críticas para la infección por mildiu velloso.

Las precipitaciones frecuentes en mayo crearán condiciones para el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas: royas (parda, amarilla) y septoriosis en el trigo; mildiu velloso en cultivos hortícolas y vid; tizón de la flor, cribado y sarna en frutales, etc. Durante el mes, las condiciones más adecuadas para realizar pulverizaciones de protección vegetal ocurrirán al inicio de la primera, a mediados de la segunda y al inicio de la tercera decena.

En mayo, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos agrícolas, pero la probabilidad de granizo permanece aumentada. En caso de daños por granizo, se recomienda que los cultivos afectados sean tratados a la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para una cicatrización más rápida de las heridas y para reducir el riesgo de infecciones secundarias.

Fuente: NIMH