

Sistema de control de plagas para cebollas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Plaga – Mosca de la cebolla *Delia antiqua*

Daños

Las larvas eclosionadas penetran en la base de las hojas, roen una galería en el tallo y se desplazan hacia el bulbo. Las plantas dañadas se retrasan en el crecimiento, se vuelven amarillas, se acaman, pueden arrancarse con facilidad y finalmente se secan. Como resultado del daño, los tejidos fermentan y emiten un olor desagradable a cebolla podrida.

Control

Se prevé el inicio del vuelo de las moscas en la segunda decena de abril. Las plantas infestadas deben eliminarse y destruirse inmediatamente. El primer tratamiento debe realizarse durante el período de vuelo masivo, que coincide con la floración del guindo. Umbral económico de daño: *5 moscas/10 barridos con red entomológica*.

Plaga – Trips del tabaco *Thrips tabaci*

Daños

Los trips succionan la savia de las hojas y aparecen en ellas manchas blanquecinas. En caso de infestación grave, las manchas se fusionan y toda la hoja se vuelve blanca. En las manchas se pueden observar pequeños puntos negros – los excrementos de la plaga.

Control

En abril, se debe prestar atención al trips del tabaco desde el principio de su aparición, cuando pasa de los residuos vegetales o las malas hierbas a la cebolla.

Plaga – Mildiu vellosa *Peronospora destructor*

Daños

En las hojas aparecen manchas elípticas, de cloróticas a verde claro, que, con tiempo húmedo, se cubren con un crecimiento esporulado de color violeta. Se crean condiciones favorables para la infección a temperaturas de 3–25 °C y con la presencia de gotas de agua retenidas en las plantas.

Control

Erradicación de plantas voluntarias y primariamente infectadas. Al detectarse las primeras manchas de la enfermedad, deben realizarse tratamientos en vegetación. En períodos de tiempo seco, los tratamientos pueden realizarse con menor frecuencia.

¡Al tratar cultivos de cebolla, se debe añadir un coadyuvante!