

Clima inestable y mayor probabilidad de granizo a finales de mayo y principios de junio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 *Брой:* 5/2021



Durante la mayor parte de los días a finales de mayo y principios de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas medias diarias por debajo de las normas climáticas para este período.

En muchas partes del país, se pronostican precipitaciones de significación agronómica. En las regiones más orientales, donde las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm durante la segunda quincena de mayo fueron las más bajas, en algunos lugares por debajo del 65% de la capacidad de campo, como en las estaciones agrometeorológicas de Sliven y Karnobat, se espera una mejora en las reservas de humedad y en las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas. Las precipitaciones durante el próximo período

serán de gran importancia para los cultivos de cereales de invierno, en los que tendrá lugar el llenado del grano, y en las regiones del sur, también la etapa de madurez lechosa. Durante el período desde el llenado del grano hasta la madurez lechosa, las larvas del chinche del trigo causan graves daños al trigo, lo que hace necesario el monitoreo de los cultivos para detectar la presencia de la plaga y, cuando la densidad de población supere el umbral económico de daño, que es de 2 larvas/m², se debe aplicar un tratamiento insecticida a la primera oportunidad.

Durante este período, tendrá lugar la formación de hojas en el maíz y el girasol. A principios de junio, solo una pequeña parte de los cultivos de girasol, principalmente los sembrados dentro del marco de tiempo agrotécnico, entrarán en la etapa de formación de la inflorescencia.

Las frecuentes precipitaciones durante el período dificultarán la implementación de las pulverizaciones de protección vegetal y crearán condiciones para el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas: mildius en cultivos hortícolas y vides, podredumbre parda en los frutos de las variedades tempranas de cerezo, moho gris en las fresas, sarna en los frutales, etc.

A finales de mayo y principios de junio, se pronostica nuevamente una mayor probabilidad de granizo, que causa graves daños a los cultivos agrícolas y pérdidas en la cosecha de fruta de los huertos que actualmente están madurando.

Recordamos que ayer una devastadora granizada destruyó la producción agrícola en varias aldeas de los municipios de Sopot y Karlovo. Según estimaciones preliminares, casi el 70% de la producción ha sido destruida por el desastre. Los daños en las plantaciones de rosas, que se encuentran en la etapa de fructificación, son extensos.

Fuente: NIMH