

Pronóstico agrometeorológico para junio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



Durante la primera decena de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable. A principios de mes, se pronostican precipitaciones significativas y una mejora de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 y 100 cm. En la mayor parte del país, las reservas de humedad del suelo para los cultivos de primavera alcanzarán niveles de hasta, y en la Llanura del Danubio – incluso por encima del 80-85% de la capacidad de campo. La humedad del suelo se mantendrá más baja en algunas de las regiones orientales y meridionales, donde las precipitaciones de mayo fueron menores, en algunos lugares por debajo del 50-60% de las normas mensuales – G. Delchev, Sliven, St. Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

A principios de junio, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo más lento, bajo condiciones meteorológicas frescas para la temporada. Durante la primera decena, se producirá el llenado del grano y la etapa de madurez lechosa en el trigo. Al final de la decena, en la cebada en algunos lugares de las regiones del sur, también se observará la madurez cerosa – Sandanski. Los chubascos limitarán las posibilidades de realizar pulverizaciones de protección vegetal contra el mildiu en vides y cultivos hortícolas, la sarna y la podredumbre parda en frutales, y contra el chinche del trigo en cultivos de cereales de invierno. Durante la segunda mitad del período, se mantiene la probabilidad de granizadas y precipitaciones locales, lo que supone un riesgo de daños para los cultivos agrícolas. El riesgo de encamado en las parcelas de trigo y cebada es alto.

Durante la segunda decena, se pronostica una mejora y normalización de las condiciones térmicas. Durante esta decena, la cebada completará su desarrollo. En la colza, se producirá la etapa de maduración.

Durante la tercera decena, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá con temperaturas cercanas a las normas climáticas. Durante este período, en el trigo en las regiones de campo, se observará la madurez cerosa.

A finales de junio, parte de los cultivos de primavera entrarán en las etapas reproductivas de su desarrollo. En los híbridos tempranos de maíz, se observará la etapa de espigado, y en el girasol sembrado dentro del plazo agrotécnico – el comienzo de la etapa de floración.

En la mayoría de los días del mes, la alta humedad atmosférica mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas: sarna, cribado y oídio en frutales; mildius en cultivos hortícolas y vides, etc. En las vides, el período interfenológico desde la floración de las inflorescencias hasta la formación del cuajado del tamaño de un guisante es crítico para la infección con mildiu y oídio. Las condiciones más adecuadas para llevar a cabo las extremadamente importantes pulverizaciones de protección vegetal ocurrirán durante la primera mitad de la segunda y durante la tercera decena de junio.

A lo largo del mes, la probabilidad de granizadas permanecerá aumentada. En caso de daños por granizo, es aconsejable que los cultivos frutales y hortícolas afectados sean tratados con fungicidas que contengan cobre en la primera oportunidad.