

A finales de junio – altas temperaturas y precipitaciones locales

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



A finales de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo cálido y, en algunos lugares, caluroso. El desarrollo de los cultivos agrícolas en la mayoría de las zonas de campo procederá bajo unas reservas de humedad buenas y muy buenas en las capas de suelo de 50 y 100 cm (más del 80-85% de la capacidad de campo) como resultado de las precipitaciones significativas de las últimas dos semanas, que en algunos lugares del centro y este de Bulgaria alcanzaron y superaron el doble de las normas de junio (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Se producirán excepciones en algunas de las regiones más occidentales y meridionales, donde se han registrado precipitaciones por debajo de lo normal y las reservas de humedad del suelo al inicio del verano son

insatisfactorias para los cultivos de primavera en la capa de 50 cm – por debajo del 65% de la capacidad de campo (estaciones agrometeorológicas: Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Durante el período, el girasol estará en la etapa de formación de la inflorescencia. A principios de julio, en los cultivos sembrados dentro del plazo agrotécnico, principalmente en las regiones del sur, también se observará el inicio de la etapa de floración.

En el maíz, procederá la formación de hojas. En los híbridos más tempranos, se observarán las etapas de espigado y floración de la espiga. A finales de junio y principios de julio, se deben inspeccionar los cultivos de maíz para detectar la presencia de una de las plagas más importantes – el taladro del maíz (*Ostrinia nubilalis*), y cuando la densidad de la plaga supere el umbral económico de daño, es imperativo un tratamiento oportuno.

Las altas temperaturas pronosticadas durante la última semana de junio limitarán el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas, con la excepción de los oídios.

Durante el próximo período, el trigo completará su desarrollo incluso en los campos más altos.

Durante el período, se pronostican nuevamente precipitaciones locales, con mayor probabilidad en el este de Bulgaria, donde el inicio de la campaña de cosecha se verá adicionalmente obstaculizado.

Fuente: NIMH