

El déficit de humedad del suelo en agosto será un factor limitante para el desarrollo de los cultivos agrícolas.

Автор(и):

Дата: 09.08.2021 Брой: 8/2021



Tras el prolongado calor de julio, durante los primeros días de agosto las condiciones agrometeorológicas seguirán determinadas por un tiempo seco y caluroso. Las temperaturas máximas extremadamente altas pronosticadas para el inicio del mes, superiores a 39-40°C, alterarán el curso normal de los procesos fisiológicos en los cultivos agrícolas. Valores de este orden, combinados con una baja humedad del aire, provocarán esterilidad en los cultivos hortícolas de la producción de campo tardía.

A principios de agosto, dependiendo de la precocidad de los híbridos de maíz, se observarán las fenofases de grano lechoso, pastoso y madurez completa. En el girasol, tendrán lugar las fases de desarrollo y maduración de la semilla. En la vid, se observará el envero y el ablandamiento de las bayas. En muchas regiones del país, las condiciones limitarán las posibilidades de labranza debido a la falta de humedad del suelo. Es aconsejable realizar labores de rastrojo en las superficies liberadas de trigo y cebada para destruir la vegetación de malas hierbas, romper los capilares del suelo y preservar la humedad del mismo. Las condiciones para llevar a cabo pulverizaciones de protección vegetal en cultivos hortícolas y plantaciones perennes existirán principalmente por la mañana, durante las horas más frescas del día. También se mantiene la probabilidad de granizo y daños a los cultivos agrícolas.

En agosto, el factor limitante para el desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos será el déficit de humedad del suelo. Las precipitaciones por debajo de lo normal pronosticadas para el mes, en el contexto de la sequía desarrollada a finales de julio, no tendrán un significado económico particular, lo que hará necesario aplicar dosis de riego aumentadas para los cultivos agrícolas tardíos. A principios de agosto, necesitarán mayores dosis de riego los segundos cultivos y los híbridos de maíz más tardíos, en los que tendrá lugar la formación y el llenado del grano, así como las variedades de frutales y vides más tardías, que se encuentran en proceso de engrosamiento del fruto.

Las condiciones térmicas por encima de lo normal pronosticadas para el mes conducirán a un acortamiento de los períodos interfásicos en el desarrollo de los cultivos de campo tardíos. Durante la primera decena, parte de los híbridos tempranos de maíz completarán su desarrollo, y en los medios-tempranos se observará la fase de grano lechoso. En el girasol, en la Llanura Danubiana y en las regiones del sur, tendrá lugar la fase de maduración. A mediados de la segunda decena, una gran parte de las parcelas de girasol en las zonas de campo entrarán en madurez técnica. Durante la tercera decena, en los híbridos medios-tardíos de maíz predominará la madurez pastosa, y en la soja la fase de maduración.

Las condiciones meteorológicas de agosto limitarán el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas, con la excepción de los oídios en cultivos hortícolas, variedades tardías de frutales y vid. Las pulverizaciones de protección vegetal durante el mes deben realizarse durante las horas frescas del día con productos que tengan un intervalo pre-cosecha apropiado, acorde con el período de maduración de los cultivos.

En agosto, el suelo seco y compactado en muchos lugares de las regiones de campo del país dificultará la realización de labores de calidad como la labranza profunda y la preparación pre-siembra de las superficies destinadas a la siembra de colza de invierno.

Fuente: NIMH