

En septiembre: buen nivel de reservas de humedad y condiciones adecuadas para realizar trabajos de campo estacionales

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Durante la primera mitad de la primera decena de septiembre, las condiciones agrometeorológicas permanecerán inestables, con precipitaciones frecuentes que mantendrán buenas reservas de humedad en las capas superiores del suelo en la mayoría de las zonas de campo. Las precipitaciones generalizadas que cayeron durante la tercera decena de agosto, superando en muchas partes del país los 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oriájovo - 54 l/m², Knézha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzhali - 72 l/m², Chirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), aumentaron las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm. Estas precipitaciones llegaron tarde

para parte de los cultivos de primavera cultivados en condiciones de secano, que, como resultado del déficit de humedad del suelo, completaron su vegetación prematuramente.

Durante la primera y la mayor parte de los días de la segunda decena de septiembre, el desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos que han superado los efectos adversos de la sequía estival proseguirá a un ritmo acelerado, con temperaturas en torno y por encima de las normas climáticas. A principios de septiembre, se completará el desarrollo de los híbridos de maíz de ciclo medio-tardío. En los híbridos tardíos, se observará la fase de madurez lechosa, y a mediados de mes – la fase de madurez cerosa.

A principios de la segunda decena, se pronostican nuevamente precipitaciones y se espera un mayor riesgo para el desarrollo de patógenos que causan podredumbre de la fruta madura y en maduración y de la cosecha de uva - moho gris en la vid, podredumbre parda tardía en los frutos de las variedades de árboles frutales de otoño-invierno.

Durante el mes, se esperan períodos con tiempo relativamente seco y condiciones más favorables para llevar a cabo los trabajos de campo estacionales: cosecha del girasol y de los híbridos de maíz más tempranos, realización de labranza profunda y preparación pre-siembra de las áreas designadas para la siembra con cultivos de invierno, y la siembra de la colza de invierno, durante la segunda mitad de la primera y la mayor parte de los días de la segunda decena. Hasta finales de la segunda decena de septiembre, se aplicarán los límites de tiempo agrotécnicamente óptimos para la siembra de la colza.

Durante la tercera decena de septiembre, se pronostica una estabilización del tiempo, una disminución sustancial de las temperaturas y los cambios transitorios en las condiciones agrometeorológicas típicos del final del verano y el inicio del otoño. Las precipitaciones esperadas durante este período proporcionarán humedad para una emergencia normal de los cultivos de colza de invierno sembrados dentro de los plazos agrotécnicos.

En la fase de emergencia, los daños a la colza son causados por el pulguilla de la col (individuos adultos) y la mosca sierra de la col (falsas orugas), lo que requiere que se monitoricen los cultivos emergidos para detectar la presencia de estas plagas y, cuando su densidad supere el nivel de daño económico (NDE para el pulguilla de la col - 2 escarabajos por m²; NDE para la mosca sierra de la col - 2-3 falsas orugas por m²), se debe realizar un tratamiento oportuno.

No se pronostican heladas en las zonas de campo hasta finales de septiembre, lo que proporcionará condiciones para la formación de producción adicional a partir de cultivos hortícolas de la producción tardía de campo.

Fuente NIMH