


A finales de septiembre y principios de octubre, las condiciones serán favorables para el desarrollo de patógenos que causan podredumbre en el cultivo sin cosechar.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



En septiembre, en algunos lugares de las regiones meridionales (Háskovo, Pazardzhik, Chirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas), cayeron precipitaciones económicamente significativas de entre 15 y 20 l/m² que proporcionaron la humedad necesaria para la emergencia de la colza de invierno sembrada dentro del plazo agrotécnico.

Se pronostica una mejora en las condiciones agrometeorológicas a finales de mes. Durante el período, los híbridos tardíos de maíz completarán su desarrollo y alcanzarán la madurez completa. En las variedades tardías de frutales y viñedos, los procesos de maduración procederán con temperaturas en torno a las normas climáticas.

Durante el período, no se esperan precipitaciones significativas y las condiciones permitirán completar la cosecha de los cultivos de primavera tardíos, realizar la labranza previa a la siembra en las áreas designadas para sembrar trigo y cebada, y aplicar fertilizantes minerales. Durante el período, comienza el plazo agrotécnico para la siembra de cultivos cerealistas de invierno en los campos altos y el Prebalcán. Para finales de septiembre, las condiciones permitirán superar los retrasos en la siembra de la colza de invierno. El período es adecuado para la siembra otoñal de espinacas y para el establecimiento de nuevas plantaciones de fresa.

Al comienzo del período, en localizaciones aisladas en los campos de cuenca, no se puede descartar la posibilidad de formación de heladas, lo que requiere la cosecha oportuna de los productos susceptibles a daños por heladas.

Durante la primera semana de octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable, y durante la segunda mitad del período, también por temperaturas por debajo de lo normal. Las precipitaciones pronosticadas para la primera semana de octubre retrasarán la limpieza de áreas de cultivos tardíos en hileras. El tiempo húmedo y fresco a mediados de la primera decena será un requisito previo para el desarrollo de patógenos que causan podredumbre: botritis en la cosecha no recolectada de las variedades tardías de uva para vino, y podredumbre parda tardía en los frutos de las variedades otoño-invierno de frutales.

Las precipitaciones caídas a finales de septiembre en las regiones noroccidentales, en parte de las regiones nororientales y en el campo de Sofía, en el rango de 20-30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Oriahovo, Sofía, V. Tarnovo, Dobrich), aumentaron las reservas de humedad en las capas superiores del suelo. Durante el período siguiente, en Bulgaria Occidental y las regiones centrales, se pronostica nuevamente la probabilidad de precipitaciones locales e intensas, lo que impedirá la implementación de la labranza previa a la siembra en las áreas designadas para sembrar con cultivos de otoño. Se esperan retrasos importantes en la siembra de la colza de invierno. Las condiciones agrometeorológicas adversas a finales del verano y principios del otoño, la sequía y las posteriores precipitaciones intensas, son la razón por la que en muchos lugares de las regiones de campo se han perdido los plazos agrotécnicos de septiembre para la siembra de colza, un cultivo que requiere

una agronomía precisa. A principios de octubre, comienza el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria.

Fuente: NIMH