

Pronóstico agrometeorológico para octubre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



En octubre, las condiciones agrometeorológicas serán dinámicas, con temperaturas cercanas a las normas climáticas y precipitaciones por encima de las normas mensuales.

Durante los primeros días de octubre, se pronostican temperaturas más altas de lo habitual para la temporada, creando condiciones para la formación de un rendimiento adicional de los cultivos hortícolas tardíos, así como para un aumento del contenido de azúcar en los frutos de las variedades otoñales de frutales y de las variedades tardías de uva vinífera.

Tras las temperaturas superiores a lo normal, se pronostica un enfriamiento a corto plazo y una normalización de las condiciones térmicas durante la segunda mitad de la primera decena del mes.

Durante la primera decena de octubre, se esperan precipitaciones significativas, lo que dificultará aún más las actividades agrotécnicas estacionales. Se esperan mejores condiciones para llevar a cabo la labranza previa a la siembra y la siembra de los cultivos de invierno durante la primera mitad de la segunda decena y durante la mayor parte de los días de la tercera decena.

La sequía y las posteriores precipitaciones significativas, en algunos lugares intensas, a finales del verano y principios del otoño fueron la razón para perder las fechas óptimas de siembra en septiembre para la colza de invierno. Una parte significativa de las superficies planificadas se sembrará en octubre, después de los plazos agrotécnicos. Debido a estas razones objetivas, existe la probabilidad de que los cultivos de colza sembrados tardíamente no logren formar una roseta (7-8 hojas) durante su vegetación otoñal – la fase en la que las plantas invernan con éxito.

Octubre es el período óptimo para la siembra de cultivos cerealistas de invierno. Durante la primera decena es el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, del 15 al 25 de octubre – en el sur de Bulgaria, y a finales de mes – en las zonas de la costa del Mar Negro.

Durante el mes, las etapas iniciales de vegetación de los cultivos de invierno sembrados procederán a un ritmo moderado, dada la presencia de buenas reservas de humedad en las capas superiores del suelo. A finales de octubre, en el trigo, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las etapas de emergencia y tercera hoja. En los cultivos sembrados más tempranamente, a finales de septiembre y principios de octubre, también se observará el comienzo de la etapa de ahijamiento. En la colza, predominará la formación de hojas.

Las condiciones térmicas pronosticadas para octubre, cercanas a la norma, son un requisito previo para un aumento de la población del topillo campesino – una de las plagas peligrosas en los cultivos de invierno. Para finales de mes, los cultivos de invierno deben ser inspeccionados para detectar la presencia de la plaga, y si su densidad supera el umbral económico de daño (2 colonias activas por decárea), son necesarias medidas oportunas de protección vegetal (cebos envenenados colocados en las entradas de las colonias).

A finales de octubre, las condiciones permitirán la implementación de ciertas actividades fitosanitarias en huertos frutales. Los huertos de manzanos y perales afectados por la sarna, después de la cosecha, deben tratarse con una solución de urea al 5% para reducir la infección. En las especies de frutales de hueso, después de la caída masiva de las hojas, se recomienda pulverizar con una mezcla bordelesa al 2% contra los agentes causantes de la cribado, la podredumbre parda temprana y el enrollamiento de la hoja del melocotonero.

Fuente: NIMH