

Pronóstico agrometeorológico para noviembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Durante la primera quincena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por tiempo seco y temperaturas superiores a las normas climáticas. Hasta mediados de mes, el factor limitante para el desarrollo de los cultivos de otoño sembrados seguirá siendo el déficit de humedad del suelo. En partes de las regiones meridionales y sudorientales (estación agrometeorológica de Karnobat), la sequía resultante pondrá en duda la supervivencia de parte de los cultivos germinados y emergidos.

A finales de octubre, el nivel de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 y 100 cm fue inusualmente bajo, en muchos lugares del sur de Bulgaria – por debajo del 40% de la capacidad de campo (estaciones

agrometeorológicas: Plovdiv, Pazardzhik, Sliven). En partes de las regiones sudorientales (estación agrometeorológica de Karnobat) no había humedad en toda la capa de suelo de un metro.

A principios de noviembre, la sequía limitará la realización de las labores estacionales del suelo y, en algunas de las zonas de campo, retrasará la siembra de los cultivos de cereales de invierno más allá de los plazos agrotécnicos.

Durante la segunda quincena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Desde mediados de la segunda hasta mediados de la tercera decena, se pronostican precipitaciones, así como una mejora en las reservas de humedad del suelo en las capas superiores y en las condiciones para el progreso de las etapas iniciales de vegetación de los cultivos de otoño sembrados. Durante este período, el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno tendrá lugar con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas para la segunda mitad del mes.

A finales de noviembre, el trigo y la cebada se encontrarán en las fases de emergencia y formación de la 1ª, 2ª y 3ª hoja. Para una pequeña parte de los cultivos en ciertos lugares de las regiones de la llanura del Danubio (estaciones agrometeorológicas: Bazovets, Novachene, en la región de Ruse), donde las lluvias locales a principios de otoño aseguraron humedad para la vegetación inicial de los cultivos de cereales de invierno, también se observará la fase de ahijamiento.

No se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos de otoño emergidos durante el mes. A principios de noviembre, debe continuar la inspección de los cultivos para detectar la presencia de plagas – minador de la hoja del trigo, moscas de los cereales – y donde su densidad supere el umbral económico de daño (para las moscas de los cereales el UED es de 3–4 ejemplares/m², para el minador de la hoja del trigo – más de 3 larvas/m²), se debe realizar un tratamiento oportuno.

Condiciones favorables para realizar pulverizaciones de protección vegetal de otoño en huertos para limitar infecciones de sarna, podredumbre parda temprana, cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero y otros patógenos invernantes ocurrirán durante la primera quincena de noviembre, y para plantar árboles frutales – durante la tercera decena.