

# Diciembre – preste atención a las actividades fitosanitarias en los cultivos perennes

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



Durante la mayor parte de los días de diciembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo dinámico, con alternancia de breves períodos de temperaturas medias diarias en torno, por debajo y por encima de las normas climáticas.

A principios de mes, el mayor contenido de humedad en las capas superiores del suelo limitará la realización de las labores estacionales de preparación del terreno. A mediados del periodo, no se esperan precipitaciones, lo que brindará una oportunidad para llevar a cabo actividades fitosanitarias en los cultivos permanentes.

El enfriamiento ocurrido a finales de noviembre provocó una ralentización y, en los campos más altos y el Prebalcán, donde se formó una capa de nieve, un cese de los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño.

A principios de diciembre, se pronostica un aumento de las temperaturas, pero sus valores medios diarios, con excepción de algunas localidades del sur de Bulgaria y a lo largo de la costa del Mar Negro, no superarán el mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

Durante el mes, en la mayor parte del país, los cultivos sembrados en otoño permanecerán en un estado de latencia relativa. Nuevamente se observarán excepciones en los cultivos de las regiones meridionales y sudorientales a finales de la primera y durante la primera mitad de la segunda decena del mes. Durante este tiempo, se pronostican temperaturas por encima de lo normal, con valores máximos superiores a 10–12°C y condiciones para una vegetación tardía en los cultivos de cereales de invierno, pero es poco probable un cambio en el estado fenológico de los cultivos.

Este año, una parte significativa de los cultivos de trigo pasará el invierno en una etapa inicial de su desarrollo. La sequía durante la primera mitad del otoño en la mayor parte del país restringió y retrasó la vegetación de los cultivos de cereales de invierno. Por esta razón objetiva, los cultivos entrarán en el invierno en diferentes fases fenológicas: emergencia, 1–2–3 hojas y comienzo del ahijamiento. Solo una pequeña parte de los cultivos de trigo en ciertas localidades de la Llanura Danubiana – la estación agrometeorológica de Novachene y la región de Ruse – se encuentra en la fase de ahijamiento, en la que los cultivos resisten mejor las condiciones invernales.

En diciembre, las temperaturas mínimas pronosticadas, de hasta menos 9–10°C, en condiciones sin capa de nieve y con una persistencia más prolongada, supondrán un riesgo para los cultivos de cereales de invierno que han emergido pero aún no se han endurecido.

Las precipitaciones esperadas durante el mes, en torno y por encima de la norma, aumentarán el nivel de las reservas de humedad en la capa de suelo de 50 y 100 cm. Tras las precipitaciones generalizadas de la segunda quincena de noviembre, que en muchas partes del país superaron los 40–50 l/m<sup>2</sup>, se superó el déficit de humedad en los cultivos sembrados en otoño.

*Fuente: NIMH*