

Febrero – restaura la latencia en los cultivos sembrados en otoño y detiene el desarrollo de algunas especies de frutales de hueso.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2023 Брой: 2/2023



La ola de frío a finales de enero, tras las temperaturas inusualmente altas para la temporada, restauró la latencia en los cultivos sembrados en otoño e impidió el desarrollo prematuro en algunas de las especies de frutales de hueso.

En febrero, las condiciones agrometeorológicas serán cada vez más dinámicas. Durante la mayoría de los días de la primera decena estarán determinadas por temperaturas por debajo de lo normal, pero sin valores mínimos críticos para los cultivos agrícolas en hibernación. En la mayor parte del país, a excepción de las regiones del

sureste y la costa del Mar Negro, se pronostican nevadas, formación de capa de nieve y una mejora en las condiciones para la hibernación de los cultivos sembrados en otoño.

A principios de la segunda decena, se espera un calentamiento y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. Las temperaturas pronosticadas hasta finales de febrero en la mayoría de las zonas de campo estarán cerca de las normas climáticas y mantendrán los cultivos de cereales de invierno en latencia. Se esperan nuevamente excepciones en las regiones del sur y a lo largo de la costa del Mar Negro. En estas regiones, durante la segunda decena, se pronostica que los valores medios diarios estarán alrededor y por encima del mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño. A finales de febrero, los cultivos de trigo estarán en las etapas de crecimiento de la tercera hoja y el ahijamiento.

Durante el mes, las temperaturas mínimas pronosticadas, en el rango de menos 12-13°C, están por encima de los umbrales críticos para los cultivos de cereales de invierno que han entrado en la etapa de ahijamiento. Estos valores, en condiciones sin capa de nieve, supondrán un riesgo para los cultivos que hibernan en la etapa de tercera hoja (estaciones agrometeorológicas: Kneja, Targovishte, Kyustendil, Pazardzhik, Chirpan, Sliven, Yambol, Dolni Chiflik).

Las precipitaciones esperadas en febrero, alrededor y por encima de las normas climáticas, aumentarán las reservas de humedad del suelo en las capas de un metro y dos metros. Las precipitaciones significativas durante la segunda y tercera decena de enero, en muchos lugares del país por encima de 60-70 l/m², y en algunas regiones del sur – por encima de 120-130 l/m² (Haskovo-165 l/m², Kardzhali-214 l/m², Chirpan-133 l/m², Stara Zagora-144 l/m²), aumentaron bruscamente el nivel de reservas de humedad en los cultivos de cereales de invierno. En la mayoría de las zonas de campo, la reserva total de agua en los cultivos sembrados en otoño en la capa de suelo de un metro alcanzó niveles superiores al 90% de la CC (capacidad de campo).

En febrero, se darán condiciones más adecuadas para la poda en viñedos y huertos, y para realizar pulverizaciones de protección invernal de plantas en huertos, durante la segunda decena. Las frecuentes precipitaciones durante el mes mantendrán encharcadas las capas superiores del suelo, lo que dificultará el abonado de cobertera de los cultivos sembrados en otoño con fertilizantes minerales nitrogenados y la realización de la labranza previa a la siembra en áreas destinadas a la siembra con cultivos de primavera temprana (guisantes, veza, avena, cebada de primavera).

Fuente: NIMH