

A finales de febrero y principios de marzo – un período adecuado para sembrar zanahorias y cebollas de plantón.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.02.2023 *Брой:* 2/2023



Durante la mayor parte del período comprendido entre finales de febrero y principios de marzo, las condiciones agrometeorológicas seguirán determinadas por temperaturas superiores a lo normal, lo que mantendrá activos los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno.

En el trigo y la cebada, se observarán las etapas de crecimiento de la tercera hoja y el ahijamiento. En las especies de frutales de hueso, la fase predominante será la de hinchazón masiva de las yemas.

Hacia el final del período, se pronostica un descenso de las temperaturas y sus valores medios diarios se aproximarán al mínimo biológico requerido para la vegetación en los cultivos de cereales de invierno.

Condiciones más favorables para el abonado de cobertera de los cultivos sembrados en otoño con fertilizantes minerales nitrogenados, para realizar la labranza estacional del suelo y la poda en huertos y viñedos, se presentarán a finales de febrero.

Las precipitaciones pronosticadas para finales de febrero y principios de marzo pospondrán los tratamientos fitosanitarios en especies de frutales de hueso contra la lepra del melocotonero, la moniliosis temprana y la cribado. El período será adecuado para plantar conjos y sembrar espinacas y zanahorias.

Fuente: NIMH