

Pronóstico agrometeorológico para marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Las anomalías climáticas durante la segunda quincena de febrero, con temperaturas máximas inusualmente altas para la temporada, superando los 21-22°C en muchas de las zonas de tierras bajas (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C), llevaron a la activación de los procesos de vegetación en los cultivos sembrados en otoño y a un desarrollo prematuro de los árboles frutales.

Durante el primer período decenal de marzo, solo en algunos lugares del sur de Bulgaria – Plovdiv, Pazardzhik, Sandanski, Kardzhali y Haskovo, se registraron precipitaciones económicamente significativas de entre 20-30 l/m2, lo que llevó a una mejora en las reservas de humedad del suelo en los cultivos sembrados en otoño.

En las regiones central y oriental, las temperaturas estuvieron por encima de las normas climáticas y por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

Durante la mayoría de los días del segundo período decenal en las regiones de tierras bajas del país, se pronostican temperaturas cercanas a las habituales para el período, así como condiciones para una vegetación retrasada en los cultivos de cereales de invierno.

Se espera un aumento de las temperaturas y una activación de los procesos de vegetación en los cultivos sembrados en otoño y en las plantaciones perennes durante la primera mitad del tercer período decenal. A finales de marzo, la etapa de ahijamiento predominará en el trigo y la cebada.

Durante el mes, los cultivos frutales pasarán por varias etapas: desde la hinchazón y brotación de las yemas frutales hasta el racimo verde, la floración y el cuajado de frutos en las especies de fruta de hueso de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero).

En marzo, se pronostican temperaturas mínimas en el rango de menos 5-10°C - valores críticos para las flores y los frutos jóvenes de los árboles frutales.

Las precipitaciones esperadas durante el mes, alrededor y por encima de la norma, aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm. Como resultado de las precipitaciones por debajo de lo normal en febrero, el nivel de reservas de humedad del suelo en la capa de 50 y 100 cm en los cultivos de cereales de invierno en las regiones del extremo sur y sureste fue inusualmente bajo para la temporada - en algunos lugares por debajo del 55% de la capacidad de campo (estaciones agrometeorológicas de Sliven, Chirpan).

En marzo, el tiempo dinámico pronosticado, con precipitaciones frecuentes, dificultará la implementación de las actividades agrotécnicas estacionales. Condiciones más favorables para llevar a cabo las pulverizaciones de protección vegetal previas a la floración en los árboles frutales ocurrirán durante la segunda mitad del primer período decenal. Durante el mes, el mayor contenido de humedad en las capas superiores del suelo limitará la implementación de la labranza previa a la siembra en las áreas destinadas a la siembra con cultivos de primavera tempranos y medio-tempranos. Por esta razón, existe la probabilidad de perder las fechas óptimas de siembra para el girasol en las regiones del sur.

A mediados de marzo comienza el período agrotécnico (15-20.03) para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, y a mediados del tercer período decenal (25.03–5.04) – en la Llanura Danubiana.

Dónde y cuándo en las diferentes regiones del país habrá condiciones para llevar a cabo actividades de protección vegetal, consulte [AQUÍ](#)

