

Condiciones agrometeorológicas inestables y dinámicas a finales de marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 *Брой:* 3/2023



A finales de marzo, las condiciones agrometeorológicas se caracterizarán por una mayor dinámica. Durante la primera mitad del período, se pronostican temperaturas por encima de lo normal y una activación de los procesos de vegetación en los cultivos de otoño y las plantaciones perennes. En el trigo, la etapa de ahijamiento ocurrirá a gran escala. En algunos lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones del sur, también se observará el comienzo de la etapa de elongación del tallo en los cultivos de cereales de invierno (estaciones agrometeorológicas Novachene, Silistra, Haskovo).

A finales de mes, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio sustancial. Durante los últimos días de marzo, estarán determinadas por temperaturas por debajo de las normas climáticas, cercanas al mínimo

biológico requerido para la vegetación de los cultivos de otoño y los cultivos de primavera sembrados. En las regiones del noreste y en las tierras altas, existe una probabilidad pronosticada de precipitaciones, incluyendo nieve, y un riesgo de daño para las especies de frutales de hueso que han entrado en la etapa de floración.

Las precipitaciones esperadas durante la última semana de marzo mejorarán las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm. A finales de la segunda decena de marzo, en partes de las regiones del sur y del este, el nivel de reservas de humedad del suelo en los cultivos de cereales de invierno en las capas de 50 y 100 cm era bajo para el comienzo del período de vegetación primaveral, en algunos lugares por debajo del 65% de la capacidad de campo (CC). Se registraron reservas relativamente buenas, superiores al 85% de la CC, en los cultivos de otoño en las regiones del noroeste del país (estaciones agrometeorológicas: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Durante la mayoría de los días del próximo período, el clima inestable pronosticado con precipitaciones frecuentes dificultará la implementación de las pulverizaciones de protección vegetal en los huertos, la labranza previa a la siembra y la siembra de los cultivos de primavera de media estación.

A mediados de la tercera decena de marzo (25.03–05.04), comienza el período agrotécnico para la siembra de girasol en la Llanura Danubiana.

Fuente: NIMH