

'Унивок® – protección extraterrestre contra enfermedades en cereales'

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 24.03.2023 Брой: 3/2023



„Извънземна“ защита от болести

Fungicida de **Corteva Agriscience™** con una nueva sustancia activa **Inatreq™ active**, un nuevo modo de acción y una nueva **formulación iQ-4**

UNIVOC® es un nuevo fungicida que ofrece una acción preventiva, de parada y curativa excepcional contra todas las enfermedades de importancia económica en los cultivos de cereales. Es un fungicida de dos componentes y doble sistemía que contiene prothioconazole, uno de los triazoles más novedosos, con acción sistémica, erradicante y preventiva dirigida al control de enfermedades en cereales, incluyendo especies de royas, manchas foliares y fusarium, y la sustancia activa completamente nueva **Inatreq™ active** de un nuevo grupo químico y con un nuevo modo de acción contra un amplio espectro de enfermedades, cuya ventaja más

significativa es que es el nuevo referente contra las especies de *Septoria* y una herramienta para el manejo de resistencias contra este patógeno. Los ingredientes activos en **UNIVOC®** se complementan en un llamado efecto sinérgico, lo que brinda a los agricultores una nueva herramienta para controlar todas las enfermedades en los cultivos de cereales.



Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

НОВ!

Начин на действие

Интихибира митохондри-алното дишане

Произведеното количество на аденозин трифосфат (АТР) е намалено и защото АТР е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и губите умират.

Inatreq™ active es una molécula creada a partir del actinomiceto *Streptomyces* y una posterior fermentación. Este hecho demuestra el efecto favorable del producto sobre el medio ambiente y sobre los cultivos.

UNIVOC® proporciona una duración de protección excelente, suficiente para salvaguardar los cultivos incluso bajo la mayor presión de infección, combinada con un efecto fisiológico expresado en la estimulación de la fotosíntesis, el bloqueo de la hormona etileno formada en el cultivo bajo condiciones de estrés, la estimulación de la formación de raíces y, sobre esta base, ayuda al cultivo a alcanzar su máximo potencial de rendimiento y lograr parámetros de alta calidad del grano.



Отличен в класа си

<i>Septoria tritici</i> Септория по листата	<i>Drechslera / Helminthosporium</i> Мрежести петна
<i>Puccinia striiformis</i> Жълта ръжда	<i>Erysiphe graminis</i> Брашнеста мана
<i>Puccinia recondita</i> Кафява ръжда	<i>Pseudocercospora</i> Базично пниене
<i>Fusarium spp.</i> Фузариум по класа	<i>Rhynchosporium secalis</i> Листен пригор

Унивок®
Inatreq active
ФУНГИЦИД

НОВ!

Según los agricultores que utilizaron **UNIVOC®** en 2022, el fungicida proporciona un control excelente del oídio, la mancha foliar amarillo-parda, el fusarium, el pie negro, la roya parda, la roya amarilla, la fusariosis de la espiga, la mancha temprana y la septoriosis. **UNIVOC®** se aplica a una dosis flexible dependiendo del momento de aplicación, de la siguiente manera: T1 – 120 ml/da; T2 – 130 ml/da y T3 para protección contra fusarium a una dosis de 130 a 150 ml/da.

Debido a su nuevo modo de acción, **UNIVOC®** no presenta resistencia cruzada con otros fungicidas, lo que lo convierte en una nueva arma anti-resistencia para controlar las enfermedades primaverales en los cultivos de cereales.

UNIVOC® se presenta en una formulación especial basada en la tecnología iQ-4 para una mejor adhesión y penetración en las partes vegetales del cultivo y para una protección más duradera contra los patógenos.

La tecnología iQ-4 es una formulación recientemente patentada que contiene un sistema de adyuvantes especialmente diseñado.



Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

Продължителна и сигурна защита



До 6 седмици след третиране в
зависимост от условията



Нетретирана контрола



Унивок®

Las ventajas incluyen:

- Mejor dispersión y cobertura en la superficie foliar incluso con bajos volúmenes de agua
- Mejor penetración y redistribución en los tejidos vegetales
- Proporciona un 97.5% de cobertura de las partes vegetales
- Ocho días después del tratamiento, el 90% del producto aún está presente en las partes vegetales
- Actividad prolongada y confiable hasta 6 semanas después del tratamiento, dependiendo de las condiciones climáticas