

Durante el tercer período de diez días de abril, las condiciones serán favorables para un aumento del fondo infeccioso de una serie de enfermedades fúngicas.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023*



Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo variable con precipitaciones frecuentes, lo que mantendrá un nivel muy bueno de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y buenas condiciones para la vegetación de los cultivos de otoño y los cultivos de primavera recién sembrados. Las precipitaciones significativas que cayeron durante la primera y segunda decena de abril en la mayor parte del país superaron las normas mensuales (Vidin - 61 l/m², Vratsa - 84 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Shumen - 86 l/m², Dobrich - 80 l/m²,

Haskovo - 77 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Elhovo - 91 l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) y mejoraron las reservas de humedad en las capas más profundas del suelo también. Al final de la segunda decena, en la mayoría de las zonas de campo, las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm para los cultivos de cereales de invierno alcanzaron niveles superiores al 80-85% de la capacidad de campo.

En la mayoría de los días del próximo período, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo moderado, con temperaturas cercanas a las normas climáticas y, al final del período, ligeramente por debajo. Durante el período, el trigo estará predominantemente en la etapa de alargamiento del tallo, y en la cebada, en algunos lugares de la Llanura Danubiana (estación agrometeorológica de Novachene), también se observará el inicio del espigado. La colza de invierno estará predominantemente en la etapa de floración. En los cultivos de girasol y maíz, dependiendo de las fechas de siembra, se observará la emergencia y la formación de hojas.

En el centro-norte y noroeste de Bulgaria, nuevamente debido a las lluvias prolongadas y las condiciones climáticas desfavorables, se está retrasando la siembra. Los productores han asegurado las semillas necesarias, las áreas han sido preparadas y, en condiciones favorables, los agricultores están listos para sembrar en la primera oportunidad. Las áreas sembradas hasta ahora son muy pequeñas en comparación con el mismo período de años anteriores.

Las frecuentes precipitaciones pronosticadas durante la tercera decena de abril crearán condiciones para un aumento de la presión de infección de una serie de enfermedades fúngicas: septoriosis y roya de la hoja en cereales de invierno; en frutales – tizón de la flor (podredumbre parda temprana), cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero, sarna, lo que requiere, en la primera oportunidad después de que cesen las precipitaciones, la aplicación oportuna de medidas de protección vegetal.

Fuente: NIMH