

A principios de mayo – condiciones para la formación de heladas en los campos altos y cuencas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.05.2023 *Брой:* 5/2023



Las precipitaciones generalizadas que cayeron durante la segunda quincena de abril mantuvieron buenos niveles de reservas de humedad del suelo para los cultivos agrícolas en la capa de 50 cm, entre el 80 y el 90% de la capacidad de campo (CC).

Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas continuarán determinadas por un tiempo inestable. Los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas proseguirán a un ritmo moderado bajo temperaturas medias diarias cercanas e inferiores a las normas climáticas para finales de abril y principios de

mayo. El trigo de invierno se encontrará predominantemente en la fase de crecimiento de alargamiento del tallo. La colza continuará su etapa de floración. En el maíz y el girasol, se observará la emergencia y el comienzo de la formación de hojas. En las especies frutales, tendrán lugar la floración, la foliación y la formación del cuajado. En la vid, se observará el desarrollo de 1 a 3 hojas.

El tiempo inestable durante el período, con chubascos frecuentes, dificultará la realización de la labranza presembrado y la siembra de los cultivos de primavera tardíos, así como la implementación de las pulverizaciones de protección vegetal. Tras el cese de las precipitaciones, se recomiendan tratamientos preventivos contra el mildiu y la excoresis en la vid, la sarna en las especies de fruta de pepita, la podredumbre de la flor (moniliosis temprana) y la cribado en los frutales de hueso, y contra el enrollamiento de la hoja del melocotonero.

Al comienzo del período, en los campos y cuencas más elevados, se darán condiciones para la formación de heladas en el suelo y para daños a los cultivos agrícolas.

Fuente: NIMH