

'Aumento de la probabilidad de granizadas y alta presión infecciosa de patógenos fúngicos en cultivos agrícolas en junio'

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Durante la primera decena de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y fresco para la temporada. Las precipitaciones previstas durante la decena mantendrán un alto nivel de reservas de humedad del suelo en las capas de 50 cm y 100 cm – en la mayoría de las zonas de campo por encima del 80-85% de la capacidad de campo (CC). La presencia de reservas de humedad del suelo muy buenas a principios de junio tendrá un efecto beneficioso en los cultivos de cereales de invierno, en los que procederán el llenado del grano, la formación del grano y la etapa de madurez lechosa en los cultivos de las regiones meridionales y sudorientales del país. Durante el período interfásico llenado del grano – madurez

lechosa, el daño al trigo es causado por las larvas del chinche del trigo, lo que requiere la inspección de campo de los cultivos y, cuando la densidad de la plaga supera el umbral económico de daño (2 larvas/m²), un tratamiento oportuno.

Después del tiempo fresco al comienzo de la segunda decena, se pronostica un aumento de las temperaturas y una aceleración de las tasas de desarrollo de los cultivos agrícolas. Para mediados de junio, en la mayoría de las zonas de campo, la cebada alcanzará la etapa de madurez cerosa.

Durante la mayoría de los días de la segunda mitad de junio, el desarrollo de los cultivos agrícolas tendrá lugar a temperaturas cercanas a las normas climáticas. Al comienzo de la tercera decena, el trigo estará predominantemente en la etapa de maduración.

Para finales de mes, parte de los cultivos de primavera entrarán en etapas de desarrollo reproductivo: en el girasol, se observará el inicio de la floración, y en los híbridos de maíz temprano – el espigado y la floración de la espiga.

Las condiciones meteorológicas de junio mantendrán un fondo infeccioso elevado de patógenos fúngicos: mildius en cultivos hortícolas, podredumbre parda tardía en cultivares de cereza tardíos, sarna y oídio en árboles frutales. En la vid, el período interfásico desde la floración de las inflorescencias hasta el cuajado del fruto al tamaño de un guisante es crítico para la infección por mildiu.

Durante el mes, las condiciones más favorables para realizar pulverizaciones de protección vegetal ocurrirán en la primera mitad de la segunda y durante la mayoría de los días de la tercera decena.

En junio, la probabilidad de granizadas permanecerá elevada. Después de una granizada, los cultivos frutales y hortícolas afectados deben tratarse a la primera oportunidad (preferiblemente dentro de las 48 horas posteriores al evento) con fungicidas que contengan cobre.