

Julio – una prueba para los cultivos agrícolas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Durante la mayoría de los días de la primera y segunda décadas de julio, las condiciones agrometeorológicas continuarán determinadas por un tiempo inestable, con precipitaciones frecuentes, lo que dificultará la actividad más importante de la temporada: la cosecha de trigo y el tratamiento oportuno contra enfermedades y plagas en los cultivos agrícolas. Las lluvias por encima de lo normal de junio en la mayor parte del país, con excepción de las regiones del sureste, han empeorado el estado fitosanitario de los cultivos hortícolas y frutales, y en algunos lugares de las regiones occidentales ha provocado mermas en la producción de cerezas.

Durante la primera y segunda décadas de julio, se pronostica nuevamente una mayor probabilidad de precipitaciones intensas, sustanciales y granizo, otro desafío más para los cultivos agrícolas y un riesgo de desgranado de la cosecha de grano maduro. Durante este período, la vegetación de los cultivos de primavera

con buen suministro de humedad procederá a un ritmo moderado, bajo temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas. En el maíz, dependiendo de su precocidad, se observarán diferentes etapas: formación de hojas, espigado, floración de la espiga y emisión de los estigmas. En el girasol en las zonas de campo, tendrán lugar la floración, la fertilización y el llenado del grano.

Durante la tercera década, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá bajo las condiciones cálidas típicas de finales de julio. En este período, se pronostican temperaturas máximas extremadamente altas, en algunos lugares de hasta 38-39°C, lo que afectará negativamente la floración y la fertilización en los cultivos hortícolas y en los híbridos de maíz más tardíos. Durante la década, los híbridos de maíz temprano entrarán en la etapa de madurez lechosa. En el girasol sembrado dentro del plazo agrotécnico, en algunos lugares de la Llanura Danubiana, se observará el inicio de la etapa de maduración.

El tiempo relativamente seco y caluroso pronosticado para la tercera década de julio limitará el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas, con excepción de los oídios en los frutales, cultivos hortícolas y vides. En los frutales, no se debe subestimar el control de la segunda generación de polillas de la fruta. Los tratamientos contra enfermedades y plagas deben realizarse durante las horas más frescas del día, utilizando productos fitosanitarios con un intervalo pre-cosecha apropiado, de acuerdo con el período de maduración de los cultivos.

Fuente: NIMH