

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



En julio, en los **huertos de manzanos** donde no se ha producido infección de sarna, se suspende la pulverización contra esta enfermedad. En presencia de infección en hojas y frutos y con lluvias frecuentes, persiste el riesgo de infecciones tardías y un aumento en el grado de daño a los frutos, lo que en este caso hace necesarios tratamientos incluso durante este período.

Para los cultivares de manzano susceptibles al oídio, la pulverización contra esta enfermedad también continúa. Para el control simultáneo de ambas enfermedades, se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da y Kumulus – 600–900 g/da contra el oídio, y Chorus 50 WG – 0.03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da y Captan 80 WG – 150–180 g/da contra la sarna. Para el control simultáneo de ambas enfermedades, son adecuados los siguientes: Flint Max 75 WG – 0.02%, Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Para prevenir la aparición de resistencia del hongo causante de la sarna (*Venturia inaequalis*), lo mejor es alternar productos con diferentes modos de acción sobre el patógeno o utilizar mezclas de fungicidas para su control.

Los cultivares resistentes a la sarna – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, etc., se pulverizan solo contra el oídio.

Para el **peral**, debe continuarse la pulverización contra la sarna y las manchas foliares blancas y marrones.

Para el control de estas enfermedades, se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Para el **ciruelo** en julio, la pulverización se dirige contra la podredumbre parda y la roya. Contra la podredumbre parda, la pulverización se realiza con uno de los siguientes fungicidas: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0.045%, Geoxe – 40–60 g/da. Contra la roya, está aprobado Signum WG – 45 g/da, que también es eficaz contra la podredumbre parda.

A principios de julio, los frutos de los cultivares tempranos de melocotonero comienzan a madurar y durante este período no se pulverizan. Para los **cultivares tardíos de melocotonero**, continúa el control del oídio, la cribado y la podredumbre parda. Contra el oídio, se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0.03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Para el control de la podredumbre parda, la pulverización se realiza con Delan 700 WDG – 0.05%, Chorus 50 WG – 0.045% o Luna Experience – 63–75 ml/da.



En julio, maduran los albaricoques y no se pulverizan.

Para la **frambuesa**, durante este período no se realiza ninguna pulverización, con la excepción de los **cultivares remontantes** como Lyulin. Para ellos, se requieren tratamientos contra la didimella y la antracnosis. Se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Signum WG – 100 g/da y Funguran OH 50 WP – 0.15%. Con lluvias frecuentes y alta humedad del aire, también es necesaria la pulverización contra la podredumbre gris. Se utiliza Switch 62.5 – 100 g/da.

Después de la cosecha, las hojas de las **plantaciones de fresa** se siegan, se retiran de la plantación y se destruyen mediante quema o se entierran para que se descompongan.