

La segunda quincena de julio – tiempo seco y caluroso

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 *Брой:* 7/2023



En la segunda quincena de julio, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo acelerado bajo temperaturas superiores a lo normal para la segunda decena del mes.

Para el maíz, dependiendo de la precocidad de los híbridos, se observarán diferentes etapas: formación de hojas, espigado, floración de la espiga y emisión de los estigmas. En el girasol, tendrán lugar la floración y el llenado de grano. El consumo activo de agua de los cultivos y la ausencia de precipitaciones de significación agrícola durante el período conducirán a una disminución de las reservas de humedad del suelo. En ciertas áreas del este de Bulgaria, se observará el agotamiento de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm, lo que hará necesario aplicar un régimen de riego apropiado.

Las condiciones para llevar a cabo pulverizaciones de protección vegetal estarán presentes durante las horas más frescas del día, por la tarde y temprano en la mañana. Durante el período, deben continuar los tratamientos contra el oídio, la sarna y la carpocapsa en los huertos, y contra el oídio y la polilla del racimo en los viñedos.

El tiempo cálido y seco pronosticado requiere que la cosecha de granos se lleve a cabo con mayor precaución y cumpliendo las medidas agrotécnicas para prevenir el riesgo de incendios en las zonas agrícolas.

Fuente: NIMH