

A finales de julio y principios de agosto, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá con temperaturas cercanas a las normas climáticas y bajo un déficit de humedad del suelo.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023*



El clima caluroso durante la mayor parte de los días de la tercera decena de julio, con temperaturas máximas extremadamente altas de hasta y por encima de 40-42°C, alteró el curso normal de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas. Estos valores causaron estrés térmico y quemaduras foliares en parte de los cultivos de primavera tardía, y caída prematura de hojas en los frutales. (En la estación agrometeorológica de Silistra se

observa amarillamiento prematuro de las hojas en el 50% de los maizales cultivados en condiciones de secano).

Tras el breve pero significativo enfriamiento al final del pasado período de siete días, durante los últimos días de julio y principios de agosto el desarrollo de los cultivos agrícolas proseguirá con temperaturas cercanas a las normas climáticas y en condiciones de déficit de humedad del suelo. Las precipitaciones a finales de julio fueron de carácter local y en la mayor parte del país, a excepción de ciertos lugares en las regiones del noroeste (N. Selo, Lom, Knezha, Pleven) y del sureste (Sliven, Karnobat, Burgas), fueron insignificantes, por debajo de 10 l/m². Durante el período siguiente, no se pronostican precipitaciones de significación agronómica, y la aplicación de un régimen de riego adecuado sigue siendo una medida prioritaria para los cultivos agrícolas tardíos. A principios de agosto, los híbridos de maíz temprano entrarán en la etapa de masa pastosa, en los híbridos de media estación se observará la etapa lechosa, y en los híbridos de maíz más tardíos tendrá lugar la formación y llenado del grano. En el girasol, en partes de la Llanura Danubiana y en las regiones del sur, procederá la etapa de maduración.

A finales de julio y principios de agosto, las pulverizaciones de protección vegetal deben realizarse durante las horas más frescas, utilizando productos con un intervalo pre-cosecha adecuado, acorde con el período de maduración de los cultivos. En las plantaciones frutales, no se debe subestimar el control de la segunda generación de polillas de la fruta. Se recomienda tratar los cultivos hortícolas afectados por las granizadas ocurridas al final del período pasado con fungicidas que contengan cobre.

Fuente: NIMH