

Cuidado de protección vegetal para la vid en agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2023 Брой: 8/2023



En este período, las vides se encuentran en la etapa fenológica desde «*envero*» hasta «*maduración de la baya*».

Mildiu de la vid

La enfermedad se desarrolla cuando hay precipitaciones, rocío abundante y un descenso de la temperatura. En hojas envejecidas la enfermedad aparece en forma de numerosas pequeñas manchas en mosaico, delimitadas por los nervios. En bayas agrandadas aparece la forma «*podredumbre parda*», que se extiende desde los pedicelos. Las bayas infectadas se marchitan, se vuelven marrones y se momifican.

Los racimos que ya han alcanzado el envero y se han ablandado no son atacados. Con el envejecimiento de los tejidos, el mildiu cesa su actividad.

Estrategia de control de plagas: Para reducir las manifestaciones tardías de la enfermedad, es necesario un buen cubrimiento de la masa foliar con PPP.

Productos autorizados de acción por contacto: Bordo Mix - 500-600 g/ha, Vitra 50 WP - 0.15%, Kocide 2000 WG - 0.12%, Cuproxat FL - 0.3%, Cuprocin 35 WP - 200-300 g/ha, Pergado F 45 WG - 140-200 ml/ha, Polyram DF - 0.2%, Funguran OH 50 WP - 0.15%, Champion WP - 0.15 %.

Cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo del mildiu – lluvias frecuentes y tiempo más fresco – el primer tratamiento debe realizarse con fungicidas de acción sistémica.

Productos autorizados con acción localmente sistémica y sistémica: Alial 80 WG - 75-330 g/ha, Folpan 80 WDG - 0.2%, Delan 700 WDG - 300 ml/ha, Cabrio Top - 0.15%, Quadris 35 SC - 0.075%, Melody Compact 49 WG - 150-175 g/ha, Mikal Flash - 0.3%, Ridomil R WG - 500 g/ha, Ridomil Gold Combi 45 WG - 200 g/ha, Folpan 80 WDG - 0.15%, Profiler 71.1 WG - 200-225 g/ha, Solofol - 188 g/ha.



Oídio

Mientras que las lluvias frecuentes favorecen las infecciones de mildiu en la vid, el tiempo cálido acompañado de una alta humedad relativa del aire promueve el desarrollo del oídio. En bayas agrandadas e infectadas por oídio, aparecen manchas de color marrón oscuro, que se hacen visibles al limpiar el recubrimiento polvoriento. El oídio se desarrolla superficialmente, el interior de la baya permanece sano y continúa creciendo, la piel se agrieta, las semillas quedan expuestas y parte del jugo fluye al exterior. Después de que las bayas se ablandan y alcanzan el envero, el oídio ya no las ataca y se desarrolla solo en los pedúnculos, brotes laterales y puntas verdes de los brotes.

Estrategia de control de plagas: Tras la detección de la infección, se continúa con los tratamientos.

Productos fitosanitarios autorizados: Eminent 125 ME - 24 ml/ha; Carbicure 500 g/ha; Collis SC - 0.04%; Quadris 25 SC - 0.075%; Kumulus DF - 800 g/ha; Kusabi - 30 ml/ha; Microthiol - 1210 ml/ha; Talendo 20 EC - 20-25 ml/ha; Thiovit Jet 80 WG - 0.3%; Topaz 100 EC - 0.015%; Flint Max 75 WG - 0.016%; Sulgran - 1250 g/ha; Taegro - 18.6-37 g/ha; Dinali - 65 ml/ha; Domark 10 EC - 100 g/ha; Password 25 WG - 50 g/ha, Reviona - 130 ml/ha; Riza 25 EW - 50 ml/ha; Sercadis - 50 ml/ha; Systiva - 0.012%, Spirox - 60 ml/ha; Vivaldo - 20 ml/ha; Domark 120 EC - 25-30 ml/ha.

Podredumbre gris (Botrytis)

El daño más típico de la enfermedad en las bayas se observa alrededor del período de su maduración. En caso de infección, en las bayas aparecen manchas de color marrón pálido, sobre las cuales la piel se desprende con facilidad. La enfermedad afecta rápidamente a todo el racimo y pasa a los vecinos. Con tiempo húmedo, las partes de la planta atacadas se cubren abundantemente de moho gris. Con la maduración de la uva, la propagación y el grado de ataque de la podredumbre gris aumentan.

Estrategia de control de plagas: En el ablandamiento y envero de la baya, se realiza un tratamiento con uno de los fungicidas registrados.

Productos fitosanitarios autorizados: Akoidal - 0.25%, Carbio Top - 0.2%, Orius 25 EW - 0.04%, Thiovit Jet 80 WG - 0.3%, Flint Max 75 WG - 0.016%, Folicur 250 EW - 0.04%, Folpan - 0.15%, Geox WG - 100 g/ha, Mevalon - 160-400 ml/ha, Prolectus 50 WG - 120 g/ha, Switch 62.5 WG - 100 g/ha, Flow 80 WG - 187.5 g/ha.



Polilla del racimo de la vid

Durante agosto, hasta la segunda mitad de septiembre, continúa el vuelo de las mariposas de la tercera generación de la plaga. Las larvas de esta generación dañan las bayas de uva en maduración y ya maduras enredándolas con hilos de seda. Como resultado del daño, se crean condiciones para la penetración del agente causal de la podredumbre gris.

Estrategia de control de plagas: El tratamiento debe realizarse al alcanzar el Umbral de Tratamiento (UT): para variedades de uva de mesa 7-8 larvas por 100 racimos, y para variedades de uva para vino 10-12 larvas por 100 racimos.

Productos fitosanitarios autorizados: Lamdex Extra - 100 g/ha, Coragen 20 SC/Voliam - 15-27 ml/ha, Meteor - 70-90 ml/ha, Decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha.



Ácaro amarillo de la vid

Durante agosto, se observa el solapamiento de poblaciones de varias generaciones. En caso de infestación grave, las láminas foliares de la vid se deforman, se vuelven ásperas y crujen al aplastarlas. Las temperaturas superiores a 32-35°C son letales para las poblaciones del ácaro. En la primera mitad de septiembre, las hembras se desplazan bajo la corteza vieja de las plantas de vid para invernar.

Estrategia de control de plagas: El tratamiento se realiza contra adultos y larvas cuando se alcanza el *UT - 9-10 individuos/hoja* –, *hasta finales de agosto*.

Productos fitosanitarios autorizados: Danitron 5 SC - 100 ml/ha, Nissorun 10 WP – 75 g/ha, Nissorun Plus – 120 ml/ha, Thiovit Jet 80 WG – 2000 g/ha, Shirudo - 25 g/ha.

** El artículo fue actualizado el 15.08.2025.*