

Septiembre – condiciones favorables para la formación de rendimiento adicional de cultivos hortícolas tardíos

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



En la mayoría de los días de la primera decena de septiembre, se pronostican condiciones térmicas por encima de lo normal, lo que acelerará las etapas finales de desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos. Durante este período, los híbridos de maíz de ciclo medio-tardío se encontrarán en las etapas de madurez cerosa y plena, mientras que los híbridos tardíos estarán en la etapa de madurez lechosa y transición a madurez cerosa.

A principios de la segunda decena, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Hasta mediados de la tercera decena, estarán determinadas por tiempo inestable y temperaturas cercanas a las normas climáticas.

Durante este período, se pronostican precipitaciones de importancia económica que, tras la sequía acentuada, mejorarán las condiciones para realizar la labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a cultivos de otoño. Hacia finales de la segunda decena de septiembre es el momento agrotécnico óptimo para la siembra de la colza de invierno.

Durante la segunda decena, los híbridos de maíz tardíos también completarán su desarrollo, y el arroz estará en las etapas de madurez cerosa y plena. Las frecuentes lluvias pronosticadas durante la segunda y la primera mitad de la tercera decena aumentarán el riesgo de desarrollo de patógenos que causan pudrición en la producción de frutas y hortalizas en maduración – moho gris en la uva (*Botrytis cinerea*), podredumbre parda tardía (*Monilinia fructigena*) en los frutos de variedades de árboles frutales de otoño-invierno, tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans*) en tomates de producción tardía, etc.

En la segunda mitad de la tercera decena, se espera tiempo seco y condiciones favorables para la cosecha de la uva. Como resultado de las temperaturas estivales por encima de lo normal, algunas de las variedades de uva vinífera más tardías alcanzarán la madurez tecnológica antes de las fechas habituales.

A finales de septiembre, es recomendable inspeccionar los huertos de perales para detectar la presencia de una plaga peligrosa: el gorgojo del brote del peral. El control de esta plaga solo es efectivo contra los individuos adultos al comienzo del otoño. Si la densidad de la plaga supera el nivel de daño económico (3 escarabajos por árbol), es necesario un tratamiento.

En septiembre, no se pronostican temperaturas mínimas críticas, y las condiciones permitirán la formación de producción adicional a partir de cultivos hortícolas tardíos susceptibles a las heladas.

Fuente: NIMH