

Octubre – condiciones óptimas para la siembra de cereales de invierno y producción adicional de cultivos hortícolas y variedades tardías de frutales y vides.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



En octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas en torno y por encima de las normas climáticas y precipitaciones en torno y por debajo de las normas mensuales.

A principios de octubre, el pronóstico de temperaturas superiores a lo normal, con valores máximos de hasta 30-32°C, acelerará los procesos de maduración en variedades tardías de frutales y vid, y creará condiciones para cosechar producción adicional de cultivos hortícolas de producción tardía de campo (tomates, pimientos,

calabacines, pepinillos). Como resultado de las condiciones térmicas superiores a lo normal, las variedades tardías de uva para vino tinto alcanzarán la madurez tecnológica antes de las fechas habituales, y las variedades de fruta de otoño alcanzarán la madurez de recolección.

Después del tiempo relativamente seco y cálido para la temporada durante la segunda mitad de la primera decena, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Durante este período, se pronostica una disminución sustancial de las temperaturas mínimas, con condiciones para la formación de heladas en cuencas y campos elevados, lo que requerirá la cosecha oportuna de cultivos hortícolas susceptibles a daños por heladas (tomates, pimientos).

A finales de la primera y principios de la segunda decena, se esperan precipitaciones de importancia económica, una mejora de las reservas de humedad del suelo en las capas superiores y de las condiciones para llevar a cabo la labranza estacional del suelo. La sequía a finales del verano y principios del otoño en muchas partes del país, con excepción de las regiones del sureste, retrasó la labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a la siembra de cultivos de otoño. Por esta razón, en gran parte de las regiones de campo, se perdieron los plazos agrotécnicos en septiembre para la siembra de colza de invierno.



Octubre es el período óptimo para la siembra de cultivos cerealistas de invierno. Durante la primera decena es el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, del 15 al 25 de octubre en el sur de Bulgaria, y a finales del mes – a lo largo de la costa del Mar Negro.

En la mayoría de los días de la segunda mitad de octubre, las etapas iniciales de vegetación de los cultivos de otoño sembrados procederán bajo condiciones térmicas superiores a lo normal. A mediados y finales de la tercera decena, existe una probabilidad pronosticada de precipitaciones, una mejora de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y de las condiciones para el desarrollo de los cultivos cerealistas de invierno. A finales de octubre, en el trigo, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las siguientes etapas: emergencia y formación de hojas (1-3 hojas).

Las condiciones térmicas pronosticadas en octubre, en torno y por encima de la norma, son un requisito previo para un aumento de la población del topillo común – una de las plagas peligrosas en los cultivos de otoño. A finales de mes, se deben inspeccionar los cultivos de otoño para detectar la presencia de la plaga, y donde su densidad supere el umbral de daño económico (2 colonias activas por decárea), son necesarias medidas oportunas de protección vegetal (cebos envenenados colocados en las entradas de las colonias).

En los huertos de manzanos y perales, al inicio de la caída de la hoja, después de cosechar la fruta, se recomienda pulverizar los árboles con una solución de urea al 5%. Este tratamiento limita la infección por sarna.

Para las especies de fruta de hueso, contra el cancro bacteriano, el enrollamiento de la hoja del melocotonero, la cribado y la podredumbre parda temprana en albaricoque, cerezo dulce y guindo, después de la caída masiva de la hoja, se debe realizar una pulverización con una mezcla bordelesa al 2%.

Fuente: NIMH