

# Durante la segunda quincena de octubre, se espera una mejora en la condición hidrofísica de la capa superior del suelo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



La ausencia de precipitaciones durante la primera y el inicio de la segunda decena de octubre condujo a un agravamiento de la sequía en curso. En la mayoría de las regiones cultivables del país, no hay humedad productiva en la capa de suelo de 50 cm, y en ciertas áreas del suroeste de Bulgaria (estación agrometeorológica de Kyustendil) – en toda la capa de un metro.

Después del tiempo seco y cálido para la temporada previsto hasta mediados de octubre, durante la segunda mitad de la segunda decena las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Durante este período se

esperan precipitaciones generalizadas, en algunos lugares de hasta  $15-20 \text{ l/m}^2$ , una mejora del estado hidrofísico de la capa superior del suelo y de las condiciones para llevar a cabo la labranza presiembrá retrasada de las áreas designadas para la siembra de cultivos de invierno. Debido a la sequía, en muchos lugares de las regiones cultivables se han perdido los plazos agrotécnicos de septiembre para la siembra de colza de invierno. También se esperan retrasos en la siembra de cultivos cerealistas de invierno. A mediados de octubre expiran los plazos óptimos para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria. En el período siguiente comienzan los plazos agrotécnicos para la siembra de cultivos cerealistas de invierno en las regiones meridionales del país.



La sequía en Dobrudzha dificulta la preparación de las áreas para la siembra otoñal de trigo. Los plazos óptimos para colocar las semillas de la nueva cosecha son hasta finales de octubre, según los científicos del Instituto Agrícola de Dobrudzha – General Toshevo.

El período de siembra depende en gran medida de las condiciones climáticas. En los últimos años no ha sido raro que la campaña de siembra continúe en noviembre. Al mismo tiempo, el estado de los cultivos depende en gran medida de cuáles sean las temperaturas y las precipitaciones en noviembre y diciembre y de hasta qué punto las plantas se aclimaten para pasar el invierno.

Se espera que las precipitaciones previstas durante la segunda mitad del próximo período proporcionen la humedad necesaria para las fases iniciales de la vegetación de los cultivos de otoño. Al final de la segunda

decena de octubre, en los cultivos cerealistas de invierno sembrados (estación agrometeorológica de Targovishte) estarán en progreso la fase de germinación y la formación inicial de hojas.

Se producirán condiciones favorables para completar la vendimia y para la recolección de las variedades de fruta de otoño al principio y al final del período.

*Fuente NIMH*