

En noviembre, las condiciones serán favorables para realizar la labranza estacional del suelo y la siembra de otoño retrasada.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.11.2023 Брой: 11/2023



En noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas y precipitaciones en torno y por encima de las normas climáticas.

Las escasas precipitaciones y las temperaturas inusualmente altas de octubre llevaron a un agravamiento de la sequía existente. A mediados del otoño, las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm están completamente agotadas, y en parte de las regiones cultivables la humedad productiva está ausente en toda la capa de suelo de un metro. En muchas partes del país, debido a las condiciones desfavorables, se pospuso la

labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a cultivos de otoño, y se perdieron los plazos agrotécnicos para la siembra de cultivos cerealeros de invierno.

En caso de una siembra retrasada, generalmente se recomienda aumentar la tasa de siembra entre un 5 y un 10% para, si falta el ahijamiento productivo, mantener el número de espigas por metro cuadrado y así preservar los rendimientos", comparte el Jefe Asistente Alexiev del IRGR "K. Malkov" en Sadovo para Nivabg.com.

Durante la primera decena de noviembre, se espera un cambio gradual y positivo en las condiciones agrometeorológicas. A principios de mes, se pronostican precipitaciones, así como una mejora en la condición hidrofísica de la capa superior del suelo y en las condiciones para llevar a cabo la labranza estacional y la siembra otoñal retrasada.

Se esperan precipitaciones de importancia económica y un aumento en las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm durante la segunda quincena de noviembre. En este período, las fases iniciales de vegetación de los cultivos de otoño sembrados tendrán lugar con temperaturas medias diarias por encima de lo normal. A finales de noviembre, se observarán diferentes fases en el trigo y la cebada – desde la emergencia hasta la 1ª, 2ª y 3ª hoja.

Durante el mes, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos cerealeros de invierno en fase de emergencia.

En noviembre, condiciones más adecuadas para la plantación de árboles frutales y para realizar las pulverizaciones de protección vegetal de otoño en frutales, destinadas a limitar infecciones de sarna, podredumbre parda temprana, cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero y otros patógenos invernantes, ocurrirán durante la segunda decena y al final del mes.

Fuente: NIMH