

'Tiempo para plantar frambuesas de otoño'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 Брой: 11/2023



La frambuesa tiene una serie de ventajas sobre otras especies frutales: florece más tarde, no sufre las heladas primaverales y fructifica todos los años. Sus frutos son sabrosos, nutritivos, con buenas propiedades medicinales. Fortalecen la actividad cardíaca, enriquecen el organismo con vitaminas y sustancias minerales, y aumentan el apetito. Son conocidos por su efecto antipirético, debido a la presencia de ácido salicílico.

La elección del lugar para plantar frambuesas se realiza de acuerdo con los requisitos del cultivo en cuanto a condiciones climáticas y de suelo. La preparación previa del suelo incluye un arado a 30-35 cm, un arado superficial para incorporar los fertilizantes y un cultivo. Se aplica estiércol.

El período más adecuado para la plantación es desde finales de octubre hasta el inicio del clima frío. La plantación también es posible en primavera, hasta finales de marzo. La distancia entre las hileras es de 1,8 a 2 m. La plantación se realiza manualmente en surcos con una profundidad de unos 35 cm.

Las nuevas plantaciones se fertilizan con 8-10 kg/da de nitrógeno, y las que están en producción con 8-12 kg/da. En suelos más pesados, el nitrógeno se aplica una vez, a principios de primavera, y si son más ligeros, a principios de primavera y a finales de mayo. La fertilización de cobertura de las plantaciones en producción se lleva a cabo después de la floración. Si las lluvias son insuficientes, se aplica riego según sea necesario hasta mediados de agosto. La poda se realiza todos los años, durante la cual se eliminan las cañas fructíferas de 2 años y se aclaran las cañas de un año. En el segundo año después de la plantación, se dejan 2-3 cañas por planta para fructificar y las restantes se cortan bajas. En el tercer y cuarto año, aumenta el número de cañas fructíferas y las plantaciones entran en plena producción. En primavera, la poda se realiza durante la hinchazón de las yemas, eliminando aquellas dañadas por las heladas invernales, enfermedades y plagas.

Cuidado de los semiarbustos de frutos blandos durante el verano

Las frambuesas son dañadas por las enfermedades didymella, tizón de la caña, roya, antracnosis, y entre los virus, el mosaico y la clorosis de las venas. Las plagas más comunes de la frambuesa son el escarabajo de la frambuesa, los pulgones, *Agrilus*, la mosquita de la agalla de la frambuesa y la mosca de la agalla de la frambuesa.



En Bulgaria, las siguientes variedades de frambuesa son las más ampliamente distribuidas:

Lyulin: los frutos maduran del 27 de agosto al 3 de octubre. Son grandes, de color rojo intenso, brillantes, firmes, con muy buen sabor y aroma moderado. Las plantas son vigorosas y de crecimiento moderado. La variedad es altamente productiva y puede cultivarse sin estructura de soporte.

Willamette: una variedad estadounidense moderadamente productiva. Los frutos maduran en el período del 6 al 8 de julio. Son de tamaño mediano, cónicos con semillas pequeñas. Tienen un buen sabor agri dulce y aroma. Las plantas son de crecimiento moderado y se cultivan en regiones más frescas bajo condiciones de riego.

Bulgarski Rubin (Rubí Búlgaro): los frutos maduran en el período del 28 al 30 de junio. Son de tamaño mediano, ligeramente cónicos, de color rojo rubí, no se desgranar en drupas individuales, y tienen un agradable sabor agri dulce y aroma moderado. La variedad es altamente productiva.

Shopska Alena: los frutos maduran en el período del 3 al 5 de julio. Son de medianos a grandes, cónicos romos, de color rojo brillante, con brillo moderado y semillas pequeñas. Se desprenden fácilmente, con un muy buen sabor agri dulce y aroma moderado. Son adecuados para procesamiento y congelación. Las plantas son de crecimiento fuerte, ligeramente cubiertas de espinas finas. La variedad es altamente productiva.

