

Diciembre – de temperaturas estacionales superiores a la media a la restauración de la latencia relativa en los cultivos de otoño

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.12.2023 Брой: 12/2023



Tras la brusca caída de las temperaturas a finales de noviembre, que provocó una ralentización y el cese de la vegetación en los cultivos de otoño en la mayoría de las zonas de campo, a principios de diciembre las condiciones agrometeorológicas experimentarán un cambio sustancial.

Durante los primeros días del mes se pronostica un aumento de las temperaturas y los valores medios diarios en las regiones del sur y a lo largo de la costa del Mar Negro se elevarán por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

A principios de diciembre, las condiciones agrometeorológicas en el este de Bulgaria diferirán significativamente de las del resto del país. En las regiones orientales se pronostican temperaturas más altas de lo habitual para la temporada, con valores máximos de alrededor de 17°C-18°C y valores medios diarios significativamente por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

Se espera una caída de las temperaturas y la restauración de la latencia relativa en los cultivos de otoño durante la segunda mitad de la primera decena del mes.

Durante la mayoría de los días de la segunda y tercera decena, las condiciones agrometeorológicas serán dinámicas, con alternancia de períodos cortos de temperaturas medias diarias alrededor y por encima de las normas climáticas, pero dentro de rangos que mantendrán los cultivos de cereales de invierno en latencia en la mayoría de las zonas de campo del país. Una vez más, se esperan excepciones en las regiones más meridionales, donde durante los períodos relativamente más cálidos se crearán condiciones para una vegetación retardada y a corto plazo en los cultivos sembrados en otoño, pero esto no conducirá a un cambio sustancial en el estado fenológico de las parcelas.



Este año, la prolongada sequía otoñal retrasó la siembra del trigo y una gran parte de las parcelas se sembraron en noviembre, después de los plazos agrotécnicos. Por esta razón, las parcelas de noviembre entrarán en el invierno en fase de emergencia y de 1-2 hojas. En los cultivos de cereales de invierno sembrados en octubre, prevalecerán parcelas en fase de tres hojas al comienzo del invierno.

En diciembre, los valores pronosticados de temperaturas mínimas, de hasta menos 9-10°C, en condiciones sin cobertura de nieve y con una duración más prolongada, supondrán un riesgo para las parcelas tardías de noviembre que han emergido y aún no se han endurecido.

La precipitación pronosticada durante el mes estará cerca de las normas climáticas y aumentará los niveles de reservas de humedad del suelo incluso en las capas más profundas. Tras las lluvias generalizadas de lluvia y nieve durante la tercera decena de noviembre, que en muchas partes del país superaron los 50-60 //m², y en parte de la Llanura Danubiana los 80–90 //m², se produjo un aumento de las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm y se superó el déficit de humedad en los cultivos de otoño.

La precipitación esperada durante el período mantendrá un alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo y condiciones desfavorables para llevar a cabo labores estacionales de labranza y actividades fitosanitarias en huertos.

Fuente: NIMH