

A finales de febrero: condiciones adecuadas para la preparación del suelo de los campos destinados a la siembra de cultivos de primavera, la poda y la aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos permanentes.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



A finales de febrero, las condiciones agrometeorológicas seguirán determinadas por temperaturas diarias promedio superiores al mínimo biológico requerido para la reanudación y progresión de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno. Al final del período otoño-invierno de acumulación de

humedad, las reservas de humedad del suelo en la capa arable del metro superior se encuentran entre el 70% y el 90% de la capacidad de campo (CC).

Durante el período, en los cultivos de trigo y cebada de siembra tardía con desarrollo retrasado, se observará la etapa de crecimiento de la tercera hoja. La etapa de ahijamiento se observará en los cultivos de la Llanura Danubiana y en localidades aisladas de las regiones meridionales del país – estaciones agrometeorológicas de Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil y Sandanski. En las especies de frutales de hueso, se producirá la hinchazón de las yemas.

Escarabajo del suelo del trigo – *Zabrus tenebrioides*

Durante la mayoría de los días del período, con la excepción de algunos lugares en las regiones occidentales donde se pronostican precipitaciones, las condiciones serán adecuadas para: la labranza del suelo en campos destinados a la siembra de cultivos de primavera; la poda y la aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos permanentes; la inspección de los cultivos de trigo y cebada para detectar la presencia y actividad dañina del topillo común y las larvas del escarabajo del suelo del trigo. En vista de la reanudación de la vegetación en los cultivos de cereales de invierno, se debe dar prioridad a completar la fertilización nitrogenada de los cultivos.

Fuente: NIMH