

Temperaturas superiores a lo normal a principios de marzo garantizarán un progreso activo de los procesos vegetativos en los cultivos agrícolas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.03.2024 Брой: 3/2024



Las temperaturas medias diarias por encima de lo normal y los valores máximos inusualmente altos registrados, alrededor y por encima de los 20°C, alcanzando en algunos lugares 23°-24°C (Vidin, Montana, Knezha, Lovech, Veliko Tarnovo, Ruse, Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo, Elhovo, Sliven) en febrero, llevaron a la reanudación de los procesos de vegetación en los cultivos sembrados en otoño y a un desarrollo prematuro e hinchazón de yemas en los frutales de hueso y algunas especies de pepita – manzano, estaciones agrometeorológicas Nikolaevo y Novachene. Las precipitaciones por debajo de lo normal durante el mes no

permitieron alcanzar la saturación completa en la capa de suelo de un metro (capacidad de campo) en algunas zonas del Centro-Norte y Este de Bulgaria y en localidades aisladas de la Llanura de Tracia Superior.

Durante los primeros días de la primera decena de marzo, se pronostican temperaturas por encima de las normas climáticas y condiciones para el curso de la vegetación en los cultivos agrícolas. Hacia el final del período, se espera un descenso de las temperaturas a valores cercanos a las normas climáticas, próximos al mínimo biológico requerido para el curso de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno.

Durante el período, los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno procederán a un ritmo ralentizado con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas para la primera decena del mes. En el trigo y la cebada, tendrá lugar la fase de ahijamiento – inicio y ahijamiento completo. En las especies frutales de hueso, ocurrirán las fases de hinchazón de yemas, racimo verde e inicio de floración en los árboles más avanzados. En los frutales de pepita, se observará la hinchazón de yemas. En la vid, se producirá el flujo de savia – estación agrometeorológica Bazovets. Durante el período, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para las especies frutales de hueso desarrolladas tempranamente.

Las precipitaciones frecuentes durante el período limitarán las posibilidades de llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales – realizar la labranza previa a la siembra en las áreas destinadas a la siembra de girasol, completar la fertilización de cobertera de los cultivos sembrados en otoño con fertilizantes nitrogenados, completar la poda en huertos y viñedos, y realizar los tratamientos previos a la floración en los frutales.

Durante la segunda y tercera decena de marzo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo dinámico. Las temperaturas pronosticadas por encima de lo normal asegurarán una progresión activa de los procesos vegetativos en los cultivos agrícolas. Durante el mes, en el trigo y la cebada se observará la fase de ahijamiento, y en los cultivos más avanzados de la Llanura Danubiana, hacia finales de marzo ocurrirá el inicio del alargamiento del tallo. En los cultivos frutales, se observarán diferentes fases, desde la hinchazón de yemas y la brotación hasta el racimo verde y el inicio de la floración en especies frutales de hueso de floración temprana – albaricoque, melocotón, cerezo.

En marzo, las temperaturas mínimas pronosticadas de hasta menos 5°C, dependiendo de la duración de su persistencia, supondrán un riesgo para los cultivos frutales avanzados en su desarrollo en las fases de formación de yemas y floración.

Las precipitaciones esperadas a finales de la primera, a mediados de la segunda decena y a finales del mes aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro.

El tiempo inestable pronosticado durante el mes limitará las posibilidades de llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales. Condiciones más adecuadas para realizar las pulverizaciones de protección vegetal previas a la floración en huertos contra el tizón de la flor (moniliosis temprana), la criba, el enrollamiento de la hoja del melocotonero y la sarna en los frutales de pepita ocurrirán durante la primera mitad de la primera decena, al principio y al final de la segunda decena. En marzo, comienzan los períodos agrotécnicos óptimos para la siembra de girasol – a partir del 15 de marzo para el Sur de Bulgaria y a partir del 25 de marzo para el Norte de Bulgaria.

Fuente: NIMH