

Durante el tercer período de diez días de marzo – riesgo de heladas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 *Брой:* 3/2024



A finales de la segunda y principios de la tercera decena de marzo, en muchos lugares de las zonas de campo del país se crearon condiciones para la formación de heladas, que causaron daños de diversa consideración a las flores de los frutales.

Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas volverán a estar determinadas por un tiempo dinámico. Se pronostican temperaturas medias diarias por encima del mínimo biológico requerido para el curso de los procesos vegetativos en los cultivos de siembra otoñal. En el trigo y la cebada, procederá la fase de ahijamiento. Solo en localizaciones aisladas de las regiones meridionales del país se observará la fase de encañado.

Según datos del Instituto Agrícola de Dobrudzha (IAD) - General Toshevo, desde octubre de 2023 hasta finales de febrero la cantidad total de precipitaciones es de 205 litros por metro cuadrado. Sin embargo, durante los dos primeros meses de 2024 cayeron un total de 22 litros por metro cuadrado. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas altas por encima de los 16°C y en lugares de hasta 19,6°C. En estas condiciones, el trigo normalmente no entra en latencia.

En los últimos años, durante el mes de abril hemos sido testigos de lo que ya se han convertido en fenómenos comunes: bruscos descensos de temperatura con bajas temperaturas y heladas. El frío primaveral combinado con la sequía puede tener un impacto serio en el trigo.

En campos individuales se observa la presencia de septoriosis, pero todavía es demasiado pronto para el tratamiento con fungicidas, informó a Agri.bg el Prof. Ivan Kiryakov, PhD del IAD. A finales de marzo, una comisión formada por la Dirección Regional de Agricultura inspeccionará los campos de trigo en la región de Dobrich para determinar el estado de los cultivos, sus fases de desarrollo y cualquier problema potencial que deba abordarse en las zonas cerealistas.

En los cultivos permanentes ocurrirán diversas fases fenológicas: desde la hinchazón de yemas y la brotación hasta la yema floral, la floración y la foliación. Durante los primeros días del período se pronostican heladas y temperaturas mínimas negativas, lo que supondrá un riesgo para los frutales que estén avanzados en su desarrollo.

Las precipitaciones previstas en la segunda mitad del período limitarán las oportunidades para el trabajo de campo. Condiciones más adecuadas para llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales: la labranza previa a la siembra y la siembra de girasol, así como la aplicación de tratamientos fitosanitarios en los cultivos agrícolas, estarán disponibles al comienzo del período. Los tratamientos deben realizarse con tiempo en calma y a una velocidad del viento de hasta 2-3 m/s. Durante el período comienza el marco óptimo agrotécnico para la siembra de girasol en el norte de Bulgaria.

Fuente: NIMH y Agri.bg