

Actividades agrotécnicas en el huerto en abril

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.04.2024 *Брой:* 4/2024



En abril, las condiciones agrometeorológicas serán cada vez más dinámicas. Durante la primera quincena del mes estarán determinadas por un tiempo inestable con precipitaciones frecuentes, lo que mejorará las reservas de humedad del suelo. Como resultado de las precipitaciones inferiores a lo normal en marzo, con excepción de algunas zonas del oeste de Bulgaria, las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 cm y 100 cm serán insatisfactorias para el inicio del periodo de vegetación primaveral.

Durante la primera y el inicio de la segunda decena de abril, las temperaturas pronosticadas estarán por encima de la norma mensual. Durante la mayoría de los días de la segunda quincena de abril, el desarrollo de los cultivos agrícolas tendrá lugar bajo temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas.

Durante la segunda mitad de la segunda decena, se pronostica como posibilidad la formación de heladas. Las temperaturas mínimas pronosticadas, de hasta menos 2°C, si persisten durante un tiempo prolongado, serán críticas para las flores y el cuajado joven de los frutales.

Durante el mes, las frecuentes precipitaciones pronosticadas y la probabilidad de granizo crearán condiciones para un aumento del fondo infeccioso de una serie de enfermedades fúngicas en los frutales – tizón de la flor (podredumbre parda temprana), sarna, cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero y otras.

Tras el granizo, necesariamente después de la floración, para reducir el riesgo de infecciones secundarias por patógenos, es recomendable realizar un tratamiento con fungicidas que contengan cobre a la primera oportunidad.


En viveros frutales

Se realiza la labranza del suelo en semilleros, plantaciones madre y bloques de vivero. Cuando los brotes jóvenes alcanzan los 20–25 cm, se realiza el primer aporcado de las plantas madre de manzano.

Descubrimiento de los portainjertos de nogal injertados que fueron aporcados en otoño, cortando la parte silvestre a unos 0,5 cm por encima de la yema injertada.

Todos los brotes que emergen del portainjerto de las plantas injertadas plantadas en los bloques de vivero se eliminan cuidadosamente.

El retraso en esta práctica ralentiza el desarrollo del brote a partir de la yema mejorada (cultivada). A menudo, la competencia de los brotes silvestres es tan fuerte que la yema no brota en absoluto.



Continúan los trabajos de injerto con púas sobre portainjertos con yemas fallidas.

En huertos frutales

Se completa la plantación de nuevos huertos frutales.

Se completan los trabajos de relleno de los huecos dejados por árboles muertos en huertos frutales jóvenes.

Todos los árboles recién plantados deben regarse con 20–30 dm³ de agua en la cuenca del árbol alrededor del tronco.

Se completan los trabajos de formación de las copas de los árboles en huertos frutales recién plantados y jóvenes.

Se eliminan los brotes de los troncos de los árboles en huertos recién plantados. A una altura de 50–60 cm sobre la superficie del suelo, se eliminan todos los brotes. También se despuntan los brotes innecesarios en las copas de los árboles jóvenes.

Los brotes en huertos frutales jóvenes se despuntan.

Se realiza la poda para reducir el vigor de los manzanos y perales de crecimiento fuerte.

Esto se recomienda para árboles sobre portainjertos de semilla o vegetativos vigorosos, formados como palmetas.

Continúa el reinjerto mediante injerto con púas en las copas de árboles maduros.

Se realiza el aclareo de frutos – en manzanos, algunas variedades de peral y melocotoneros.

En regiones de tierras bajas y más cálidas, se realiza una segunda labor de suelo, más superficial, y, si no se hizo en marzo, se aplica fertilizante nitrogenado.



En condiciones de sequía, se realiza el riego. Durante la floración y el cuajado, la humedad del suelo en los huertos no debe caer por debajo del 70% de la capacidad de campo.

Las colonias de abejas se transportan desde huertos donde ha terminado la floración a huertos con floración intensa.

En plantaciones de fresa



Plantación de fresas bajo película de polietileno

Se completa el relleno de los espacios vacíos en las áreas plantadas en otoño (principalmente en regiones más altas).

Comienza la plantación de material vegetal de fresa libre de virus almacenado en cámaras frigoríficas sobre bancales cubiertos con polietileno negro perforado.

Las plantas se plantan de modo que las yemas sobresalgan ligeramente por encima de la superficie, sin riesgo de que, al iniciarse la vegetación, queden bajo el polietileno. Antes de plantar, las raíces de las plántulas se sumergen en una mezcla de estiércol, tierra y agua. Si las raíces se han secado, se recortan sus puntas.

Las nuevas áreas de fresas plantadas sobre polietileno negro deben regarse por aspersión para garantizar un buen arraigo.

Se labran las plantaciones antiguas y, si no se abonaron en marzo, se realiza la fertilización previamente. Si es necesario, se riegan las plantaciones.

Se transportan de cuatrocientos a quinientos kilogramos de paja por decárea para acolchar el suelo bajo los pedúnculos florales y para proteger la fruta de la contaminación en plantaciones establecidas sin polietileno

negro. Antes de esto, se riegan las plantaciones. El suelo alrededor de las plantas se cubre con unos 10 cm de paja. El acolchado se realiza hacia el final de la plena floración.

Se labra el suelo en instalaciones de cultivo protegido y se riega si es necesario.

Hasta mediados de abril, se cosechan los últimos frutos de fresa de invernaderos calefactados.

Comienza la cosecha de fresas de invernaderos solares (sin calefacción) y túneles. Más tarde, también comienza la cosecha al aire libre.

Se ventilan regularmente los invernaderos y túneles. Se mantiene en ellos la temperatura requerida para la maduración oportuna de la fruta.

En lugares más cálidos y en plantaciones plantadas antes, se eliminan las malas hierbas que emergen en los agujeros.

La escarda se realiza con mucho cuidado para no arrancar las plantas que aún no están bien enraizadas.

En plantaciones de frambuesa

Se completa el relleno de espacios vacíos y la plantación de nuevas áreas.



Plantación de frambuesas

Se realiza la labranza del suelo para mantenerlo suelto y libre de malas hierbas y para incorporar fertilizantes.

Hacia finales del mes, se aplica un abonado de cobertura con 10–12 kg de nitrato amónico o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado. En condiciones de sequía, se realiza el riego.

En plantaciones de grosella negra

Se cuidan los bancos de multiplicación – se realiza labranza, fertilización y riego.

Se labran las plantaciones nuevas y antiguas. En condiciones de sequía, se realiza el riego.

En plantaciones con otros cultivos

Se realiza la plantación de plantas de laurel no estándar en el vivero para su posterior desarrollo.

Se realiza el injerto de yema primaveral de caqui del Cáucaso con caqui japonés (kaki) después del inicio del flujo de savia.

A finales del mes, se realiza el repicado de plántulas de limón al aire libre a 15–20 cm en la línea y 1 m entre líneas.

Dependiendo de la necesidad, se realiza la escarda y el riego de esquejes enraizados de higuera, granado y espino amarillo.

Según las necesidades de la parcela al aire libre donde se ha realizado el enraizamiento de esquejes de higuera, granado y espino amarillo, se realizan la escarda y el riego.

Continúa la plantación de caqui japonés (kaki), espino amarillo, granado e higuera en emplazamientos definitivos.

Los árboles de laurel se liberan de sus envoltorios invernales y de la protección invernal.

A finales del mes, se plantan en emplazamientos definitivos plantas enraizadas de actinidia y brinzales de laurel del año anterior. Se realiza el riego de las plantas recién plantadas.

Se plantan plántulas de actinidia repicadas en un vivero al aire libre.

Se realiza una nueva siembra de semillas de laurel al aire libre.

Comienza el injerto de yema en portainjertos de pistacho.